

GRUNDARTANGI
Rennslismælingar í vatnsbóli

Þórólfur H. Hafstað

Unnið fyrir Íslenska járnblendifélagið hf.

OS-86002/VOD-02 B

Janúar 1986



ORKUSTOFNUN
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík

Verknúmer : 872

GRUNDARTANGI
Rennslismælingar í vatnsbóli

Þórólfur H. Hafstað

Unnið fyrir Íslenska járnblendifélagið hf.

OS-86002/VOD-02 B

Janúar 1986

EFNISYFIRLIT

1	INNGANGUR.....	3
2	AÐSTÆÐUR OG UMHVERFI.....	4
3	SAMSPIL ÚRKOMU OG AFRENNSLIS.....	6
4	RENNSLISMÆLINGAR.....	9
5	LOKAORD.....	13

1 INNGANGUR

Greinargerð þessi er tilraun til að áætla minnsta rennsli til vatnsbóls Járnbendiverksmiðjunnar á Grundartanga. Hún er gerð að beiðni íslenska Járnbendifélagsins vegna áförmum fiskeldi sem ætlað er að nýta varma í kælivatni, en megnið af því vatni sem á Grundartanga er notað, fer til kælingar.

Helsta niðurstaðan er í stuttu máli þessi:

Eftir rennslismælingum í vatnsbóli og með lauslegum samanburði við úrkому og afrennsli á sama tíma, eru taldar sáralitlar líkur á að virkjað rennsli verði minna en 19 l/s. Þessi lágmarkstala styðst að mestu við tvö þurrktímabil á mælingatímabilinu; annars vegar í febrúar 1977 en hins végars í september 1985.

Einnig er talið líklegt að rennslið fari iðulega niður undir nefnt lágmark, þannig að ekki er ráðlegt að gera ráð fyrir að meira fáist úr vatnsbólinu án frekari virkjunar á upptakasvæði Svartalækjar.

Áætlað er hversu mikið vatn hefði mátt taka í hinum þurra febrúarmánuði 1977 og er niðurstaðan birt í töflu 6.

2 AÐSTÆÐUR OG UMHVERFI

Vatnsból Járnbлендiverksmiðjunnar á Grundartanga er í upptökum Svartalækjar fyrir mynni Skarðsdals sunnan í Skarðsheiði. Bólið er í riflega 90 m hæð yfir sjávarmáli og er vatnið leitt u.p.b. 10 km leið á notkunarstað á Grundartanga. 1000 m³ miðlunargeymir er staðsettur í 70 m hæð yfir sjó austan í Akrafjalli. Auk verksmiðjunnar fá allmargir bær neysluvatn úr veitunni, en mest getur hún flutt um 30 l/s.

Ráðist var í virkjun upptakalinda Svartalækjar eftir að fylgst hafði verið með rennsli hans um hríð fyrri hluta árs 1977 (tafla 6). Vatnsbólið var svo stækkað haustið 1982 og síðan hefur verið fylgst nokkuð reglulega með rennsli þess vatns sem í vatnsbólin næst (tafla 5).

Svartilækur kemur upp neðarlega í berghlaupsurð í hlíðarfætinum. Urðin er til orðin við að tvær bergfyllur hafa brotnað úr fjallsbrúninni, annars vegar úr Skarðshyrnu en hinsvegar í Skarðalsmynni. Fyllurnar hafa síðan fallið ofan bratta hlíðina og myndað urðartungur sem teygja sig úr dalsmynnini allt niður undir jafnsléttu. Flatarmál urðarinnar austan Skarðsár er nálægt 1,25 km², en sá hluti miðlar vatni til Svartalækjar. Nokkrar minni lindir eru í vestari urðartungunni, en rennsli frá þeim er vísast ekki eins stöðugt og í Svartalæk.

Urðir sem þessar eru alla jafna vel vatnsleiðandi meðan óbramlaður berggrunnurinn undir þeim er þéttur. Mestur hluti úkomunnar sem á þær fellur, sígur ofan í þær og myndar grunnvatn sem svo leitar framrásar í lindum. Séu urðirnar víðáttumiklar má búast við nokkuð stöðugu lindarennslu.

Stundum er mögulegt að átta sig á stöðugleika og hugsanlegri lágmarksvatnsgæfni linda út frá stærð vatnasviðs þeirra, sé það þekkt. Þá þurfa úrkoma og uppgufun á svæðinu einnig að vera þekktar stærðir. Samkvæmt úrkomukorti Öddu Báru Sigfúsdóttur (Jón Eyþórsson o.fl., 1971) er úrkoma hér um slóðir meiri en 1200 mm/ári. Sú úrkoma, óskert, jafngildir því að jafnaðarlega féllu ekki minna en 38 l/s til hvers ferkílómetra. Nú nýtist úrkoman ekki öll til grunnvatnsmyndunar, því hluti hennar gufar upp áður og töluvert rennur einnig burt á yfirborði, ekki síst meðan jörð er frosin á vetrum.

Í fjallendi er úrkoma alla jafna meiri en ætla mætti eftir úrkomumælistöðum á láglendi. Samkvæmt afrennsiskorti Sigurjóns Rist renna að jafnaði 80 - 100 l/s/km² af hlíðum Skarðsheiðar. Nú hagar svo til að ekki er hægt að afmarka vatnasvið Svartalækjar sérstaklega frá vatnasviði Skarðsárinna, en heildarstærðin hefur verið áætluð nálægt 5,5 km². Líklegt er að vatnasvið lækjarins sé innan við 1 km² að flatarmáli, en á hinn bóginn eru töluverðar líkur á að vatn berist inn á vatnasviðið úr Skarðsá þar sem hún rennur í gegn um urðina uppi í dalkjaftinum.

Af framansögðu má ljóst vera að áætlanir sem byggja á ofangreindum forsendum geta ekki orðið að nokkru liði við að ákvarða lágmarksrennsli til vatnsbólsins; til þess eru óvissupættirnir allt of miklir.

Tafla 1

Samanburður árlegrar úrkому á svæðinu milli Hvalfjarðar og Borgarfjarðar 1965 - 1984; mm.

Ár	Stóri- botn	Grundar- tangi	Akra- nes	Andakíls- árvirkjun	Hvann- eyri
1965	1027			1042	642
1966	1334		806	---	813
1967	1371		1019	1534	934
1968	1411		879	1337	703
1969	1620		---	1535	964
1970	1484		---	1344	863
1971	1537		935	1515	851
1972	2240		1137	1842	1081
1973	1746		1074	1656	1023
1974	1835		---	1652	1071
1975	1838		1086	1831	1014
1976	1925		1039	1830	1074
1977	1260		786	1039	586
1978	1323	795	---	1241	712
1979	1314	756	---	1097	681
1980	1488	845	---	1417	868
1981	1137	---	---	1259	891
1982	---	---	---	1373	870
1983	---	---	---	1634	1072
1984	---	1176	---	1681	1111

3 SAMSPIL ÚRKOMU OG AFRENNSLIS

Hér verður því að byggja nær eingöngu á rennslismælingum. Þær hafa verið framkvæmdar með nokkuð misjöfnu móti og verður því að samræma niðurstöður þeirra. Einnig þarf að hafa í huga að mælingarnar hafa verið misjafnlega samfelldar þau fjögur ár sem þær hafa staðið.

Til þess að geta metið árferðið á mælitímabilinu má taka mið af hegðan annarra þáttu í náttúrunnar ríki sem mældir hafa verið um lengri tíma en þann sem rennslismælingarnar í Svartalæk spanna. Þessir þáttir gætu verið:

- a) Grunnvatnshæðarmælingar í sama landshluta.
- b) Rennslismælingar í nálægu vatnsfalli.
- c) Úrkumumælingar á nálægri veðurathugunarstöð.

Grunnvatnshæðarmælingar hafa um árabil verið gerðar í Kleifarvatni og í Heiðmörk og er gjarnan tekið mið af þeim þegar ástand grunnvatns er metið. Í þessu tilviki er samanburður við lindarennnsli í sunnanverðri Skarðsheiði e.t.v ekki raunhæfur þar sem breytingar á grunnvatnshæð á nefndum stöðum eru ekki eins tíðum sveiflum háðar og lindarennnslið. Þó má geta þess að grunnvatnsborð á Suðvesturlandi fór mjög lækkandi árið 1977 þegar fyrst var mælt rennsli í Svartalæk og hélst sú þróun í höfuðdráttum tvö næstu árin. Afrennsli dragáa í grennd við Grundartanga ætti að geta gefið gleggri mynd af vatnafarinu. Þó er þar sá ljóður á að snjófyrningar og leysingaflóð aflaga gjarna alla hina finni drætti. Benda má samt að meðan mælingar stóðu yfir í Svartalæk í febrúar 1977, var afrennsli Botnsár í Hvalfirði aðeins 15 l/s/km².

Úrkumumælingar eru hvað samfelldastar og spanna lengra tímabil en nefndar vatnamælingar. Eðlilegast er því talið að styðjast við þær hér þegar meta skal hversu titt má búast við lágmarksrennsli í Svartalækjarlindum. Þó er rétt að vekja athygli á að tengsl afrennslis og úrkumu eru engan veginn ábyggileg þó svo að við úrkumumælingar verði að styðjast til að kreista sem mestar upplýsingar út úr rennslismælingatölunum.

Tafla 2

Mánaðarleg úrkoma.

Mæld við Andakílsárvirkjun 1950 - 1985

Ár	jan	feb	mar	apr	mai	jún	júl	ágú	sep	okt	nóv	des	alls
1950	285,4	26,7	135,4	18,1	62,7	63,0	47,2	55,3	70,3	133,0	62,8	60,0	1020
1951	163,3	33,0	77,4	34,8	54,7	51,3	61,2	20,9	71,3	246,5	48,7	184,9	1048
1952	116,8	195,2	67,4	79,1	42,4	17,5	51,0	17,3	23,8	111,2	62,4	14,6	799
1953	155,2	260,4	437,0	80,7	44,9	55,7	50,1	37,9	91,7	305,0	205,0	505,5	2229
1954	160,0	(330)		213,1	24,7	25,7	85,7	72,4	15,1	138,7	281,7	78,9	(1426)
1955	105,5	27,4	106,0	188,0	42,7	81,1	175,0	166,8	145,3	118,4	105,3	46,3	1308
1956	143,1	219,8	145,9	79,4	92,9	87,4	38,2	10,8	88,3	338,9	487,4	183,1	1915
1957	247,8	19,1	25,0	149,2	108,0	39,4	41,3	75,2	38,8	236,2	128,2	189,8	1298
1958	110,5	34,9	13,0	102,9	6,9	42,9	24,2	25,0	111,0	184,6	547,8	60,2	1264
1959	160,1	273,8	178,9	37,0	69,7	90,2	15,4	129,5	299,1	195,9	73,0	69,8	1592
1960	111,3	94,8	96,5	109,1	72,4	122,6	30,0	30,5	132,2	66,3	32,5	92,0	990
1961	152,3	165,9	221,1	31,0	84,4	48,0	54,5	83,0	145,4	106,6	180,9	53,7	1327
1962	208,7	230,6	0,4	227,5	37,2	95,2	70,9	56,0	140,2	163,6	141,8	217,3	1589
1963	108,1	77,9	124,8	68,3	28,5	34,0	62,7	21,1	207,9	149,9	130,6	119,6	1205
1964	279,4	119,2	176,3	59,0	43,9	88,6	102,4	11,2	48,2	191,6	(138,5)	121,7	1380
1965	76,3	115,8	39,3	34,7	15,3	72,1	47,9	40,0	63,9	380,7	126,7	29,7	1042
1966	81,6	15,4	89,2	18,8	—	109,9	78,4	103,1	68,5	75,0	219,6	99,4	(959+)
1967	129,1	160,8	113,7	174,4	22,3	116,9	31,5	143,0	152,5	48,4	202,7	238,6	1534
1968	149,0	222,5	131,5	113,8	17,7	76,3	49,5	175,6	79,1	26,7	124,4	171,1	1337
1969	98,9	81,4	245,9	193,1	33,1	113,6	86,0	133,3	176,6	180,2	47,5	145,2	1535
1970	45,1	44,4	150,4	70,7	143,8	85,8	46,3	145,9	99,4	252,6	34,2	225,7	1344
1971	64,8	181,1	120,8	162,1	83,9	25,8	77,0	49,1	136,9	199,9	146,0	267,1	1515
1972	202,4	228,5	227,6	71,5	90,9	45,8	84,9	128,0	143,5	250,1	168,8	210,3	1842
1973	213,5	222,1	241,8	85,9	71,5	77,9	39,4	105,0	109,8	247,3	145,5	96,4	1656
1974	113,2	186,8	268,5	201,4	29,1	132,2	49,7	56,1	81,2	277,6	120,0	135,9	1652
1975	121,9	229,1	198,6	71,6	149,9	62,8	34,7	142,2	141,0	96,7	317,9	264,2	1831
1976	202,4	360,1	269,1	111,4	71,9	70,7	69,9	313,0	43,0	91,8	191,9	34,6	1830
1977	101,8	2,2	77,2	70,8	63,2	111,3	89,2	71,7	181,8	64,8	68,4	(136,6)	1039
1978	155,6	20,6	99,8	57,6	177,8	77,9	26,8	63,5	41,3	266,2	206,4	47,6	1241
1979	76,5	225,7	30,7	32,2	6,1	97,5	33,4	32,3	133,6	197,6	139,0	91,9	1097
1980	114,9	204,5	94,4	225,8	58,4	37,0	46,1	79,3	86,9	152,6	190,0	127,3	1417
1981	219,8	200,0	40,6	275,3	58,0	62,2	18,3	140,9	23,9	24,4	137,0	58,9	1259
1982	128,8	161,7	192,8	178,1	32,2	40,4	135,8	70,1	104,6	44,4	123,4	160,4	1373
1983	342,6	175,4	210,9	47,9	10,7	93,0	96,9	197,7	34,9	194,7	72,2	182,6	1634
1984	100,7	355,9	152,8	194,5	76,6	106,6	64,6	152,7	67,0	55,3	123,9	254,0	1681
1985	166,8	99,5	104,9	53,3	17,3	37,3	54,3	10,4					
meðalúrkoma 1931 - 1960:													
	150	116	131	92	60	66	58	92	133	173	177	138	1386

Tafla 3

Vetrarúrkoma í Andakíl

Úrkomu janúar, febrúar og marsmánaða árin
1950 - 1985; raðað eftir samanlöögðu magni.

Röð	Ártal	Heildarmagn, mm	Röð	Ártal	Heildarmagn, mm	Röð	Ártal	Heildarmagn, mm
1	1958	158,4	13	1971	366,6	25	1956	508,8
2	1977	181,2	14	1985	371,2	26	1961	539,3
3	1966	186,2	15	1952	379,4	27	1975	549,6
4	1965	231,4	16	1967	403,6	28	1974	568,5
5	1955	238,9	17	1980	413,8	29	1964	574,9
6	1970	239,9	18	1969	426,6	30	1984	609,4
7	1978	276,0	19	1962	439,7	31	1959	612,8
8	1951	273,7	20	1950	447,5	32	1972	658,5
9	1957	291,9	21	1981	460,4	33	1973	677,4
10	1960	302,6	22	1982	483,3	34	1983	728,9
11	1963	310,6	23	1954	490,0	35	1976	831,6
12	1979	332,9	24	1968	503,0	36	1953	852,6

Í töflu 1 er sýnd ársúrkoma nálægra mælistöðva. Af þeim sést að úrkoma er áberandi meiri í Stórabotni og Andakíl en á hinum stöðvunum. Samkvæmt eðli málsins er talið æskilegt að taka mið af næsta nágrenni Skarðsheiðar og verður Andakílsárvirkjun því fyrir valinu. Ekki er talin ástæða til að ætla að verulegur munur sé á úrkому norðan heiðar og sunnan.

Hérlendis má oftast búast við að grunnvatnsrennsli verði hvað minnst síðla vetrar, en einnig síðsumars, þó sú lægð sé jafnan minni sunnan lands. Sé litið á úrkomutölur undanfarandi 36 ára á veðurathugunarstöðinni við Andakílsárvirkjun (töflur 2 og 3) sést að samanlögð úrkoma á fyrsta ársfjórðungi varð minnst árin 1958 og 1977. Febrúar 1977 var jafnframt annar þurrasti mánuður á öllu tímabilinu.

Þetta þýðir með öðrum orðum að á þessu 36 ára tímabili hefur úrkoma aðeins tvívar orðið jafnlítill eða minni en á öndverðu ári 1977, meðan rennsli Svartalækjar var mælt, hvort heldur sem litið er til úrkому einstakra mánaða eða fyrsta ársfjórðungs. Af þessu má draga þann lerdóm að viðlíka eða meiri vatnsþurrð en varð í febrúar 1977 geti orðið á 18 ára fresti til jafnaðar. Líklegt er að jafnaðarlega sé lengra en 36 ár milli úrkomurýrustu tímabilanna (þ.e. fyrsti ársfjórðungur 1958 og mars 1962), þannig að líklega verða vatnsþurrðir á við 1977 nokkrusjaldnar en á 18 ára bili.

Tafla 4

Vatnsból Grundartanga Samanburður heildarrennslis og virkjaðs.

Dags. 1982:	Reiknað rennsli	Virkjað og melt í þáverandi bóli, 1/s	Hlut virkjaðs rennslis %	Virkjað og áætl. lámarksrennsli viðbótarveitu, 1/s (ból + 4,7 1/s)
01.08	38,1	21,1	55,4	25,8
01.15	44,1	21,1	47,9	25,8
01.02	35,6	15,7	44,1	20,4
02.17	71,6	27,8	38,8	32,5
02.22	73,4	35,0	47,7	39,7
03.01	52,7	24,4	46,3	29,1
03.15	33,2	12,4 *	37,3	17,1
03.17	33,5	18,0	53,7	22,7
03.18	28,0	11,3 *	40,4	16,0
03.22	31,2	14,0 *	44,9	18,7
03.29	45,9	19,3	42,1	24,0
04.14	69,1	31,3	45,3	36,0
04.19	98,9	42,8	43,3	47,5
04.26	99,3	40,4	40,7	45,1
04.27	81,0	33,5	41,4	38,2

Virkjað rennsli er að jafnaði 44,6 % heildarrennslis.

Fylgi virkjaðs rennslis og heildarrennslis er 0,98.

Skrýningar

Reiknað rennsli í Svartalæk er rennsli um mælyfirfall + rennsli í pró - rennsli um yfirfall þróar.

Virkjað og melt í þáverandi bóli: Melt í safnþró. * merkir að notkun hafi á sana tíma mælst meiri á Grundartanga.

Í aftasta dálkinn er 4,7 1/s bætt við rennsli í ból, sem er sú lámarksviðbót sem nýja virkjunin frá haustinu 1982.

4 RENNSLISMÆLINGAR



Mælingarnar í ársbýrjun 1977 voru á heildarrennsli Svartalækjar, sem er meira en það magn sem nú hefur verið virkjað. Samanburður á var gerður á rennsli lækjarins og þess hluta sem næst í vatnsból, áður en mælistíflan í læknum eyðilagðist. Þessi samanburður er sýndur í töflu 4 og á mynd 1. Gengið er út frá að um 45% heildarrennslisins hafi náðst í þáverandi vatnsból, en ráðist var í stækkun þess um haustið 1982, eftir að mælistíflan í læknum var brostín.

Rétt er að benda á að rennslismælingarnar eru ekki nákvæmar. Í mælingagögnunum er tekið fram að mælistíflan hafi lekið svolitið og mælingum í vatnsbólinu og á vatnsnotkun niðri á Grundartanga ber ekki alltaf saman. Í þrem tilvikum er notkunin meiri þar en það sem í vatnsbólinu mældist. Þó gera megi ráð fyrir að við slíkar aðstæður geti gengið á birgðir í miðlunartank, er samt ljóst að það ástand varir ekki nema meðan birgðir endast. Það verður því að ætla að í þessum tilfellum a.m.k. sé rennslið í vatnsbólið vanmetið.

Eins og að framan segir var vatnsbólið stækkað haustið 1982. Grafin var niður safnlögn (dren) og vatni sem hún aflaði veitt í safnþró, þar sem rennslið er mælt. Nokkuð samfelldar rennslismælingar eru til frá því í ársbýrjun 1982. Þær eru hins vegar með nokkuð misjöfnu móti; stundum er rennsli í aðalvatnsból mælt (þ.e. eins og það var fyrir stækkun), í önnur skipti er heildarrennsli mælt en stundum hvorutveggja. Þessar mælingar eru sýndar í hinni löngu töflu 5, þar sem reynt er að samræma mæliniðurstöðurnar.

Eins og fram kemur í töflunni varð rennslið minnst í janúar 1984, 19,1 l/s. Ekki er þar um að kenna óvenjulítilli úrkomu, heldur frosti og snjóálogum. Sýnir það að ekki er einhlítt að miða við úrkomumælingar. Oft er gert ráð fyrir að viðbótin frá 1982 hafi gefið að minnsta kosti 4,7 l/s. Þessi tala fæst með samanburði á mælingum þegar bæði hefur verið mælt í aðalvatnsbóli og viðbótarveitu, en samkvæmt honum fæst aldrei minna vatn úr viðbótinni. Þetta er einnig sýnt á mynd 2 og á mynd 3. Fyrst eftir að hún var tekin í notkun virðist hún hafa gefið um 7 l/s (meðan alalból gaf um 35 l/s), frá ársbýrjun 1983 hefur rennslið alltaf verið innan við 6 l/s.

Eftir öllu þessu er svo tafla 6 gerð. Henni er ætlað að sýna líklegt rennsli til vatnsbóla hefðu þau verið til staðar lélega vatnsárið 1977. Af henni sést að virkjað vatnsmagn ætti ekki að hafa orðið minna en 19,7 l/s. Sé sú ályktun rétt, að viðlíka eða meiri vatnspurrð verði sjaldnar en á 18 ára fresti að jafnaði, fæst að líkur á svo litlu rennsli séu fimm sinnum á öld.



Tafla 5

Vatnsból Grundartanga.		Rennslismælingar í vatnsbóli 1982 - 1985.		Athugasemdir	
Dags.	"Aal-ból" 1/s	Ned við-bót 1/s	Athugasemdir	Ned við-bót 1/s	Ned við-bót 1/s
1982			áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
01.08	21,1	25,8			
01.15	21,1	25,8	do		
02.01	15,7	20,4	do		
02.08	29,2	33,9	do		
02.15	27,8	32,5	do		
02.22	35,0	39,7	do		
03.01	26,4	29,1	do		
03.15	12,4(16,2)*	17,1(20,9)*	do		
03.17	18,0	22,7	do		
03.18	11,3(14,5)*	16,0(19,2)*	do		
03.22	16,0(17,3)*	18,7(22,0)*	do		
03.29	19,3	24,0	do		
04.14	31,3	36,0	do		
04.17	42,8	47,5	do		
04.26	40,4	45,1	do		
04.27	36,6(35,6)*	39,2(40,3)	do		
10.19	38,8	45,8	hvertvegja malt		
11.24	35,0	42,2	do		
12.17	22,4	27,9	do		
1983			áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
01.27	64,3	70,3	do		
02.03	33,5	36,2	hvertvegja malt		
03.03	56,2	62,1	áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
03.08	55,2	60,0	do		
03.28	35,0	39,7	do		
05.03	21,1	26,0	hvertvegja malt		
05.27	51,0	56,9	do		
09.30	41,2	46,0	do		
1984			áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
01.06	23,7	28,4	do		
01.13	21,1	25,8	hvertvegja malt		
01.16	19,8	24,5	áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
01.19	16,4	21,1	do		
01.25	14,4	19,1	do		
01.30	14,4	19,1	hvertvegja malt		
02.15	55,3	60,0	áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
02.23	36,5	41,2	do		
02.29	40,4	45,1	áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
03.06	26,6	31,3	do		
03.16	36,5	42,2	hvertvegja malt		
04.17	30,6	35,4	áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
04.27	42,8	47,5	hvertvegja malt		
05.09	46,8	52,4	áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
05.15	46,8	51,5	hvertvegja malt		
06.27	45,2	29,9	do		
08.23	38,8	44,7	hvertvegja malt		
08.24	35,0	39,9	do		
09.11	38,8	44,0	áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s		
09.19	35,0	39,7	do		
10.03	38,8	43,5	do		
10.12	27,8	32,5	do		
10.18	35,0	39,7	do		

*: Hér hefur notkun verið meiri en það sem melt varð í safþró.
Talan í svigum teknar notan á Grundart. + yfirall. I bro.
"ADALÓ" er vagnaból eins og það var fyrir staddan haustið 1982
MEÐ VILBO er átt við virkni vatn alls, en althuga ber að náðu
er misjænt hvernig melt er. Óft er reið með að 4,7 1/s fást
að miðstæða knuti í virkni vatn alls.

Tafla 6

Svartilækur Rennslismælingar 1977 og á- ætlað nýtanlegt vatnsmagn.		Dags- taðar- lakjar 1977	Dags- taðar- lakjar 1977	Dags- taðar- lakjar 1977
"Aal-ból"	Alls	"Aal-ból"	"Aal-ból"	"Aal-ból"
	1/s	1/s	1/s	1/s
1984				
10.30	27,8	32,5	hvertvegja malt áætluð lágnarksviðótt; 4,7 1/s	
11.07	21,1	25,8	do	
11.14	21,1	25,8	áætluð í aðalbóll	
12.04	20,3	25,0	do	
12.12	34,1	38,8	do	
12.20	31,8	36,5	do	
12.27	26,6	31,3	do	
1985				
01.02	26,6	31,3	do	
01.08	42,1	46,8	do	
01.14	46,3	51,0	do	
01.24	34,1	38,8	do	
01.29	26,6	31,3	do	
02.05	23,1	27,8	do	
02.13	23,1	27,8	do	
02.21	19,7	24,4	do	
02.31	50,6	55,3	do	
03.01	38,0	42,7	do	
03.12	30,3	35,0	do	
03.20	23,1	27,8	do	
03.26	19,7	24,4	do	
04.02	12,2(17,3)*	16,9(22,0)*	do	
04.11	16,4	21,1	do	
05.03	16,4	21,1	do	
05.09	42,1	46,8	do	
05.15	42,1	46,8	do	
05.23	38,1	42,8	do	
05.30	34,1	38,8	do	
07.01	39,7	44,4	do	
08.15	26,6	31,3	do	
09.04	16,5	21,2	do	
09.05	19,7	22,4	do	
09.09	19,7	22,4	do	
09.11	17,7	22,4	do	
09.12	16,4	21,1	do	
09.13	46,3	51,0	do	
09.14	46,3	51,0	do	
09.15	46,3	51,0	do	
09.16	34,3	39,0	do	
09.17	41,3	46,0	do	
09.18	50,6	55,3	do	
09.19	50,6	55,3	do	
09.20	46,3	51,0	do	
09.27	42,1	46,8	do	
10.01	42,1	46,8	do	
10.02	43,8	48,5	do	
10.03	40,5	45,2	do	
10.04	38,1	42,8	do	
10.07	36,1	42,8	do	



Rennsli Svartalækjar sankvant meilingum verkslöjurnar.
Áætluð renssli til aðalbóls 4% af renssli lækjarsins
sankvant töflu 4 og mynd 1.
Rennsli alls er áætluð renssli til aðalbóls að vísindum 4,7
1/s, sem er lágmarkstensli vildararveit frá 1982.

VOD MJ 872 PHH
851215851S

Mynd 3

GRUNDARTANGI
RENNSLI Í SAFNÞRÓ VATNSBÓLS
1982-1985


Skýringar
eru við töflu 5



5 LOKAORD

það er ef til vill óþarft að minna á að engin niðurstaða er betri en þær forsendur sem hún byggir á. Við mat á þeim rennslismælingum sem hér hefur verið fjallað um hefur ekkert tillit verið tekið til þýðingarmikilla þátta svo sem uppgufunar og hitastigs og þá um leið snjóalaga. Þessi tilraun til að ákvarða líkur á vatnspurrð byggir einungis á nokkuð ósamleitum og stundum jafnvel ónákvæmum rennslismælingum annars vegar og hins vegar mánaðarlegum úrkomutölum. Er því næsta líklegt að ýmislegt geti orkað tvímælis í þessari umföllun.

Guðlaugur Hjörleifsson hjá Íslenska Járnblandifélaginu hefur bent á, að þrátt fyrir verulega sveiflukennt rennsli til vatnsbólanna sé svo að sjá að vatnsmagnið fari helst ekki niður fyrir 19 - 20 l/s. Þannig væri hugsanlegt að líta á það vatnsmagn sem "stöðugt"; ef til vill dýpra og lengra að komið og þar af leiðandi ekki eins breytileika úrkommunnar. Í þessu sambandi er rétt að líta á töflu 6, en þar er reiknað rennsli til vatnsbóla 19,7 - 21,5 l/s allan febrúarmánuð, en munurinn á þessum tölum er efalaust vel innan skekkjumarka mælinganna. Sömu sögu er að segja um öndverðan septembermánuð 1985, eins og fram kemur í töflu 5 og á mynd 4. Þar sést að eftir rúmlega hálfsmánaðar þurk fer ofurlítið að rigna um 10. september. Rennsli til vatnsbóls eykst ekki fyrr en um þrem dögum seinna. Þetta gæti bent til þess að taftími þeirrar úrkому, sem fæðir hinn "breytilega" hluta lindarennslisins væri a.m.k. þrír dagar. Samkvæmt þessum skilningi ætti dvöl hins "stöðuga" hluta að vera til muna lengri og allar sveiflur í rennsli útjafnaðar. Ekki er nauðsynlegt að líta á hinn "stöðuga" og hinn "breytilega" hlut rennslisins sem alls óskylda, heldur er víast um verulega blöndun að ræða. Hvað sem því líður er ástæða til að atla, að litlar líkur séu á að virkjað vatnsmagn fari niður fyrir 19 - 20 l/s. Hins vegar er líklegt að rennslið fari iðulega niður undir þetta mark í lengri eða skemmti þurkum, eins og í rauninni gerðist í frostakaflanum í janúar 1984 (sbr. töflu 5).



HEIMILDIR

Jón Eyþórsson og Hlynur Sigtryggsson 1971: The Climate and Weather of Iceland. I; The Zoology of Iceland I.3. Rvík og Kaupm. höfn 1971 62 s.

Markús Á Einarsson 1972: Evaporation and Potential Evapotranspiration in Iceland. Veðurstofa Íslands, Reykjavík 1972, 38 s.

Þórólfur H. Hafstað og Árni Hjartarson 1977: Grundartangi. Umsögn um lindir við Tungu. OSJKD7703. Skýrsla unnin fyrir Íslenska Járnblandifélagið. 8 s.

Veðurstofa Íslands: Veðráttan. Mánaðayfirlit. 1950 - 1985.

Íslenska Járnblandifélagið. Gögn um rennslismælingar.

Orkustofnun, Vatnsmælingar: Gögn um vatshæðarmælingar.

Sigurjón Rist 1956: Íslensk vötn. Raforkumálastjóri 1956, 127 s.