



Úttekt á lífríki á landi og jarðminjum vegna uppbyggingar við Gunnarshólma og Geirland

Magnus Göransson, Ingvar Atli Sigurðsson, Borgný Katrínardóttir,
Rannveig Thoroddsen og Robert A. Askew

Unnið fyrir Aflvaka hf.



Úttekt á lífríki á landi og jarðminjum vegna uppbyggingar við Gunnarshólma og Geirland

Magnus Göransson, Ingvar Atli Sigurðsson, Borgný Katrínardóttir, Rannveig Thoroddsen og Robert A. Askew

Unnið fyrir Aflvaka hf.

NÁTT-25001

Garðabær, febrúar 2025

Forsíðumynd: Fyrirhugað byggingarland í Gunnarshólma og Geirlandi, Hólmsá afmarkar svæðið til norðurs en í bakgrunni glittir í Nátthagavatn. Ljós m. Robert A. Askew, 22. ágúst 2024.

ISSN 1670-0120



Náttúrufræðistofnun

	Náttúrufræðistofnun	Sími 430 9000	Skýrsla nr. NÁTT-25001
	Urriðaholtsstræti 6–8 210 Garðabæ	natt.is natt@natt.is	Útgáfudagur 28. febrúar 2025
			Dreifing Opin
Heiti skýrslu / Aðal- og undirtitill Úttekt á lífríki á landi og jarðminjum vegna uppbyggingar við Gunnarshólma og Geirland			Fjöldi síðna 30
			Kort / Mælikvarði
Höfundar Magnus Göransson, Ingvar Atli Sigurðsson, Borgný Katrínardóttir, Rannveig Thoroddsen og Robert A. Askew			Verknúmer 18624
			Málsnúmer 202403-0045
Unnið fyrir Aflvaka hf.			
Samvinnuaðilar			
Útdráttur Í skýrslunni er greint frá niðurstöðum rannsókna sem Náttúrufræðistofnun vann sumarið 2024 fyrir Aflvaka hf. vegna mats á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar íbúðahverfis og heilbrigðiskjarna í Gunnarshólma og Geirlandi í landi Kópavogs. Markmið rannsókna var að safna upplýsingum um jarðminjar, gróðurfar og fuglalíf á svæðinu, leggja mat á verndargildi og meta hugsanleg áhrif á þessa þætti ef til framkvæmda kemur. Verndargildi jarðminja á athuganasvæðinu er almennt lágt. Undantekningar eru jaðar Leitahrauns meðfram Hólmsá og gervigígar við Gunnarshólma sem hafa hátt verndargildi. Allnokkrar vistgerðir á athugunarsvæðinu hafa hátt eða mjög hátt verndargildi. Nokkrar tegundir æðplantna fundust sem teljast fremur sjaldgæfar eða hafa takmarkaða útbreiðslu á landsvísu. Verndargildi gróðurs felst þó fyrst og fremst í bakkagróðri meðfram Hólmsá og við Nátthagavatn. Nokkurt fuglalíf er innan framkvæmdasvæðisins en helsta gildi þess fyrir fugla er fólgið í búsvæðum vatnafugla við Hólmsá og Nátthagavatn. Að teknu tilliti til náttúruminja er mikilvægt að viðhalda ríflegum verndarjaðri við ár- og vatnsbakka.			
Lykilorð Jarðminjar, fuglar, vistgerðir, flóra, ágengar tegundir, útbreiðsla, válistar, líffræðilegur fjölbreytileiki.			Yfirfarið MH



EFNISYFIRLIT

EFNISYFIRLIT	4
1 INNGANGUR	5
2 ATHUGUNARSVÆÐI	5
3 AÐFERÐIR	5
3.1 Jarðfræði	5
3.2 Vistgerðir og flóra	6
3.3 Fuglar	7
4 NIÐURSTÖÐUR	7
4.1 Jarðfræði	7
4.2 Vistgerðir og flóra	11
4.3 Fuglar	17
5 UMRÆÐUR	18
5.1 Jarðfræði	19
5.2 Vistgerðir og flóra	19
5.3 Fuglar	22
5.4 Samantekt	23
6 HEIMILDIR	23
7 VIÐAUKAR	26
1. viðauki. Tegundir sem skráðar voru á vettvangi og í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar	26
2. viðauki. Staðfestir eða líklegir varpfuglar innan og í grennd framkvæmdasvæðis	31



1 INNGANGUR

Áform eru uppi um uppbyggingu íbúðahverfis og heilbrigðiskjarna í Gunnarshólma og Geirlandi í landi Kópavogs, á vegum Aflvaka hf. Á þessu stigi liggur þó hvorki fyrir nákvæm hönnun né skipulag.

Í mars 2024 óskaði VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Aflvaka ehf., eftir að Náttúrufræðistofnun tæki að sér úttekt á grunnástandi lífríkis á landi, þ.e. fugla og gróðurs, og grunnástandi og verndargildi jarðminja á mögulegu áhrifasvæði fyrirhugaðra framkvæmda. Niðurstöður úttektarinnar verða lagðar til grundvallar við umhverfismat.

2 ATHUGUNARSVÆÐI

Afmarkað athugunarsvæði í landi Gunnarshólma og Geirlands miðast við möguleg áhrif framkvæmda og liggur alfarið innan Kópavogs. Svæðið afmarkast af Náttúragavatni og Hólmsá til norðurs, sveitarfélagsmörkum Kópavogs og Reykjavíkur til suðurs og landamerkjum Geirlands til austurs. Flatarmál svæðisins er 63,9 hektarar. Þjóðvegur 1, Suðurlandsvegur, liggur í gegnum athugunarsvæðið. Í sumum tilfellum var gerð úttekt á náttúruminum við utanverðan jaðar þess.

Sá hluti athugunarsvæðisins sem er innan landareignarinnar Gunnarshólma er að stærstum hluta eldra landbúnaðarland en á báðum landareignunum er byggð og allnokkur skógrækt. Graslendi í bland við mólendi er einkennandi þar sem enn er að finna náttúrulegt gróðurfar, þó með keim af áhrifum mannvistar. Töluvert rask fylgir búsetu á svæðinu, auk þess sem framkvæmdir hafa haft áhrif, meðal annars vegna efnistöku og geymslusvæðis við heimreiðina að Geirlandi og breikkunar Suðurlandsvegar.

Athugunarsvæðið er hvorki friðlýst né á náttúruminjasrá. Hins vegar fellur náttúrulegur bakkagróður meðfram Hólmsá og við Náttúragavatn undir ákvæði 62. gr. náttúruverndarlaga (Lög um náttúruvernd nr. 60, 2013). Náttúragavatn, sem liggur að norðausturjaðri athugunarsvæðisins, fellur jafnframt undir 61. gr. náttúruverndarlaga um vötn stærri en 1000 m², sem og nútímahraun í jaðri svæðisins sunnan við Suðurlandsveg. Annað nútímahraun, Leitahraun, liggur undir nær öllu svæðinu þó það sé lítt sýnilegt vegna jarðvegshulu. Í grennd við athugunarsvæðið eru Tröllabörn, sérkennileg hraundrýli sem eru friðlýst sem náttúruvætti, auk hluta gervigígaraðar sem kennd er við Lækjarbotna (Náttúruverndarráð, 1996). Athugunarsvæðið er aftur á móti allt innan vatnsverndarsvæðis í Lækjarbotnum og er nánar skilgreint sem öryggissvæði vegna grunnvatns (Umhverfissvið Kópavogsbæjar, 2022).

3 AÐFERÐIR

Vettvangsúttektir á náttúruminum fóru fram sumarið 2024. Úttekt á jarðminjum fór fram 22. ágúst, úttekt á gróðri fór fram 16. júlí, og úttekt á fuglalífi 22. maí, 3. júní og 4. ágúst 2024.

3.1 Jarðfræði

Samkvæmt jarðfræðikorti ÍSOR (2025) er Gunnarshólmi og hluti Geirlands staðsettur á Leitahrauni, sem rann fyrir um 5000 árum. Hólmskraun III, sem er forsögulegt hraun, eldra en 1100 ára, rann yfir Leitahraun sunnan við Gunnarshólma en nær ekki inn á athugunarsvæðið. Um helmingur Geirlands er á eldri hraunum (grágrýti) sem runnu á hlýskeiðum ísaldar (Pleistósen). Engin misgengi eða sprungur eru skráðar innan athugunarsvæðisins samkvæmt jarðfræðikorti ÍSOR (2025). Hins vegar sýnir Jón Jónsson (1978) sprungu í grágrýtinu í Miðmundahóli í landi Geirlands og hún er einnig merkt á korti Helga Torfasonar o.fl. (1999). Skammt suðaustan við Geirland eru hraundrýli og gervigígar í Leitahrauni og eru hraundrýlin og hluti gervigíganna friðlýst sem náttúruvættið Tröllabörn. Annað gervigígasvæði



Í Leitahrauni, Rauðhólar, sem er staðsett norðvestur af Gunnarshólma, er friðlýst sem fólkvangur. Leitahraun er sýnt í kortasjá Náttúrufræðistofnunar, sem ber heitið [Sérstök vernd náttúruvæðinga](#), en á athugunarsvæðinu eru hvorki skráð hellasvæði né gervígígar.

Á Leitahrauni er þunn hula af árseti en á grágrýtinu er ósamfelldur jökulruðningur. Ekki eru skráðar jökulrákir á grágrýtinu (Ingibjörg Kaldal o.fl., 1996).

Áður en vettvangsrannsókn fór fram voru loftmyndir af svæðinu og jarðfræðikort skoðuð. Gengið var um athugunarsvæðið og ljósmyndir teknar á vettvangi, bæði á jörðu niðri og með dróna.

3.2 Vistgerðir og flóra

Fyrirliggjandi vistgerðakort Náttúrufræðistofnunar Íslands var notað sem grunnur til að yfirfara vistgerðir á vettvangi og staðfesta eða leiðrétta kortlagningu á athugunarsvæðinu (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018a). Vistgerð vísar til svæðis sem einkennist af ákveðnum samfélögum plantna og dýra, þar sem ólífrænir umhverfisþættir eins og loftslag, jarðvegur og raki, eru svipaðir (Jón Gunnar Ottósson o.fl., 2016). Vistgerðum er einnig skipað saman eftir skyldleika í 14 meginflokkum eða vistlendi (Sigurður H. Magnússon o.fl. 2016) og ferskvatnsvistgerðir skiptast í tvo meginflokkum ferskvatns (Marianne Jensdóttir Fjeld o.fl., 2016).

Auk vistgerðakortsins var stuðst við uppfært, staffært gróðurkort af svæðinu sem byggt er á eldri gróðurkortum sem gefin voru út árið 1968 í mælikvarða 1:40.000 (Menningarsjóður, 1968). Við úrvinnslu gagna og framsetningu vistgerða á korti var einnig stuðst við ljósmyndir af vettvangi og myndir teknar með dróna. Vistgerðakort var unnið í QGIS (QGIS Development Team, 2025). Reiknað var flatarmál og hlutfall vistlenda, annarra landgerða og vistgerða og flokka innan þeirra innan athugunarsvæðisins (1. tafla).

Heildarútbreiðsla allra vistgerða á landsvísu hefur verið áætluð og frummat á verndargildi þeirra lagt fram (Jón Gunnar Ottósson og Sigurður H. Magnússon, 2016). Við mat á verndargildi vistgerða á landi var horft til þátta eins og fágætis, tegundaauðgi, grósku og kolefnisforða í jarðvegi (Jón Gunnar Ottósson o.fl. 2016). Árið 2019 var gefin út skýrsla um aðferðir við val svæða á framkvæmdaáætlun náttúruvæðingaskrár, þar sem verndargildi vistgerða var endurmetið með tilliti til fleiri þátta, auk frummats. Í skýrslunni var vistgerðum forgangsroð eftir verndargildi (forgangsvistgerðir) og hér er byggt á því mati (Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 2019). Tilgreint er hvort vistgerð sé á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar en Ísland á aðild að samningnum (Council of Europe, 2019). Í lögum um skógrækt eru skógar, bæði náttúrulegir birkiskógar og ræktaðir skógar, sem eru 0,5 ha eða stærri að flatarmáli verndaðir (Lög um skóga og skógrækt nr. 33, 2019). Síðast en ekki síst er litið til þess hvort vistgerð nýtur sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. náttúruverndarlaga (Lög um náttúruvernd nr. 60, 2013).

Æðplöntutegundir voru skráðar á vettvangi samhliða endurskoðun vistgerða. Auk þess voru fyrirliggjandi skráningar æðplantna í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar dregnar saman fyrir svæðið (1. viðauki). Tegundaheiti æðplantna eru samkvæmt Wąsowicz (2020). Mosar og fléttur voru ekki skráðar á vettvangi en leitað var upplýsinga um þá hópa í gagnagrunni stofnunarinnar. Margar skráningarnar í gagnagrunninum eru þó komnar til ára sinna og nákvæmar staðsetningar fundarstaða (GPS-hnit) eru sjaldnast tiltækar, heldur skráðar við bærjarheiti og önnur örnefni.

Æðplöntutegund á landinu hafa verið flokkaðar út frá algengni og í samhengi við það hefur verndargildi þeirra verið metið (Hörður Kristinsson o.fl., 2007). Algengnimat fyrir æðplöntur var byggist á mati á útbreiðslu tegunda á landsvísu og hve mikið var af viðkomandi tegundum þar sem þær fundust (sjá tákn fyrir algengni í 1. viðauka). Út frá gögnunum er verndargildi tegunda ákvarðað þar sem sjaldgæfar tegundir fá hátt verndargildi en algengar tegundir lægra. Verndargildin skiptast í tíu

matsflokka (1–10) (Hörður Kristinsson o.fl., 2007). Í 1. viðauka er tilgreint algengnimat og verndargildi æðplöntutegunda fundust á vettvangi á athugunarsvæðinu, auk tegunda sem áður hafa verið skráðar á svæðinu samkvæmt gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar. Þar er einnig tekið fram hvort tegund sé á válista eða friðuð samkvæmt lögum (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018b; Auglýsing um friðun æðplantna, mosa og fléttna, nr. 1385, 2021). Válistaflokkun æðplantna er unnin í samræmi við hættuflokka Alþjóðanáttúruverndarsambandsins (IUCN) og árið 2018 var æðplöntulistinn endurskoðaður samkvæmt nýjum viðmiðum.

Ekki var gerð sérstök úttekt á bakkagróðri meðfram Hólmsá eða við Nátthagavatn, umfram kortlagningu vistgerða og skráningu æðplantna þar, sem og annarsstaðar á athugunarsvæðinu. Hins vegar var stuðst við ljósmyndir og yfirlitsmyndir úr dróna til að meta umfang náttúrulegs bakkagróðurs.

3.3 Fuglar

Til eru eldri athuganir frá svæðinu sem fram fóru í byrjun aldar og verða þær hafðar hér til hliðsjónar (Jóhann Óli Hilmarsson, 2008).

Fuglatalningar fóru fram dagana 22. maí, 3. júní og 4. ágúst 2024. Talningarnar í maí og ágúst beindust að vatnafuglum, annars vegar í byrjun varptímans og hins vegar þegar ungar voru komnir á kreik. Gengið var meðfram Hólmsá, frá þjóðvegi að Nátthagavatni, og allar tegundir sem sáust á leiðinni voru skráðar.

Í júní var megináhersla lögð á mófugla en til þeirra teljast einkum vaðfuglar, nokkrar tegundir spörfugla, rjúpa og kjói. Gengið var eftir fyrirfram ákveðinni leið um framkvæmdasvæðið og fuglar sem sáust voru kortlagðir og atferli þeirra skráð, með tilliti til hvort um varpfugl var að ræða (söngur og önnur varpleg hegðun) eða ekki. Talningar fóru fram að morgni þegar virkni mófugla er meiri en yfir miðjan daginn (Brynja Davíðsdóttir, 2010). Athuganir náðu til alls framkvæmdasvæðisins auk næsta nágrennis, þar sem þekkt er að mannvirki geta haft neikvæð jaðaráhrif á fuglastofna, sem lýsa sér í lægri þéttleika sumra tegunda nær mannvirkjunum en fjær þeim (Tómas Grétar Gunnarsson, 2020; Pálsdóttir o.fl., 2024). Í sömu ferð var einnig litið eftir fuglum við Hólmsá og Nátthagavatn.


4 NIÐURSTÖÐUR

4.1 Jarðfræði

Nánast allt athugunarsvæðið er staðsett á Leitahrauni, nútímahrauni sem nýtur sérstakrar verndar samkvæmt 61.gr. laga um náttúruvernd nr. 60 (2013) (1. kort). Hraunið, sem er að mestu helluhraun, er hulið seti og lítið sést í yfirborð, auk þess sem hrauninu hefur verið raskað á stóru svæði. Verndargildi hraunsins sem heildar hefur því rýrnað, þar sem náttúrulegt yfirborðs þess er lítið sýnilegt. Yfirborð hraunsins er helst sýnilegt næst Hólmsá (1.–2. mynd). Við Gunnarshólma er gervígígasvæði (3.–4. mynd) en aðrar merkar jarðminjar sáust ekki á svæðinu. Ekki sáust nein merki um hraunhella á svæðinu en það útilokar þó ekki að hella séu til staðar.

Grágrýtið á svæðinu er mótað af jöklum og er það mikið til hulið jökulruðningi. Yfirborðið er jökulnúið en engar jökulrákir fundust (5.–6. mynd).





1. kort. Jarðfræðikort.



1. mynd. Jaðar Leitahrauns við Hólmsá. Ljós. Ingvar Atli Sigurðsson, 22. ágúst 2024.



2. mynd. Yfirborð helluhrauns við Hólmsá. Ljós. Ingvar Atli Sigurðsson, 22. ágúst 2024.



3. mynd. Gervigígasvæði við Gunnarsáholma. Ljós. Ingvar Atli Sigurðsson, 22. ágúst 2024.



4. mynd. Gjall á gervígígasvæðinu við Gunnarshólma. Ljós. Ingvar Atli Sigurðsson, 22. ágúst 2024.



5. mynd. Grágrýtisholt sunnan við Hólmsá, gervígígasvæðið fjær. Ljós. Ingvar Atli Sigurðsson, 22. ágúst 2024.



6. mynd. Grágrýtisholt og gervigígasvæði suðaustan við Gunnarshólma. Ljós. Ingvar Atli Sigurðsson, 22. ágúst 2024.

4.2 Vistgerðir og flóra

Á athugunarsvæðinu voru kortlagðar 12 landvistgerðir í fimm vistlendum auk fimm flokka annarra landgerða og tveggja ferskvatnsvistgerða (1. tafla; 2. kort). Rúmlega 60% svæðisins flokkast sem aðrar landgerðir. Þar af eru tún og akurlendi umfangsmest, samtals um 21 ha eða 33% af athugunarsvæðinu, en þar vegur túnið í landi Gunnarshólma þýngst. Þéttbýli og annað manngert land nær yfir 9,3 ha (15%) en til þess telst, auk húsbygginga, vegir og ógróið, raskað land, svo sem náma við heimreiðina að Geirlandi. Skógrækt er 2,6 ha (4%), fyrst og fremst í kringum bæjarstæði Gunnarshólma og Geirland. Alaskalúpína og uppgrætt land ná hvort um sig yfir rúmlega 3 ha (5%), mest áberandi í vegfláum meðfram þjóðvegi auk þess sem alaskalúpína myndar allnokkrar breiður upp af bökkum Hólmsár. Ekki var lagt mat á verndargildi annarra flokka innan landgerða samkvæmt frummati Náttúrufræðistofnunar en við endurmat á verndargildi vistgerða og landgerða var það metið lágt (á bilinu 4–9) (Jón Gunnar Ottóson og Sigurður H. Magnússon, 2016; Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 2019). Skógrækt nýtur hins vegar verndar samkvæmt skógræktarlögum (Lög um skógrækt nr. 33, 2019).

Af náttúrulegum vistlendum hefur graslendi mesta þekju, eða 19% af svæðinu. Umfangsmestu graslendisvistgerðirnar eru língræsi- og vingulsvist (7,1 ha), og grasengjavist (3,1 ha) en snarrótavist (1,8 ha) kemur einnig fyrir innan um annað graslendi. Allar þrjár vistgerðirnar jafa hátt verndargildi samkvæmt frummati og endurmati (21) og eru á lista Bernarsamningsins yfir vistgerðir sem þarfnast verndar (1. tafla). Mest af graslendinu er sunnan þjóðvegur og meðfram bökkum Hólmsár.


Mólendi þekur 15% af athugunarsvæðinu. Helstu mólendisvistgerðirnar eru lyngmóavist á láglandi (6,1 ha) og grasmóavist (2,4 ha) sem koma víða fyrir í misstórum blettum og flákum, einkum um miðbik svæðisins og í svokölluðum Suðurhólum sunnan þjóðvegur. Víðikjarrvist er gróskumikil

mólendisvistgerð sem kemur fyrir í deiglendi, á nokkrum stöðum, til dæmis meðfram Hólmsá, en hefur annars takmarkað útbreiðslu. Verndargildi þessar mólendisvistgerða er hátt eða mjög hátt samkvæmt frummati og á bilinu 18-25 í endurmati. Flagmóavist hefur mjög takmarkaða útbreiðslu lágt verndargildi. Þó eru allar fjórar mólendisvistgerðirnar á lista Bernarsamningsins yfir vistgerðir sem þarfnast verndar.

Votlendisvistgerðirnar gulstararflóavist, starungsmýravist og tjarnarstararflóavist eru skilgreindar sem forgangsvistgerðir með mjög hátt verndargildi samkvæmt frummati og með hæstu verndargildi samkvæmt endurmati (29–32). Þær eru á lista Bernarsamningsins yfir vistgerðir sem þarfnast verndar. Hins vegar er útbreiðsla þeirra á athugunarsvæðinu mjög takmörkuð, samtals 0,3 ha.

Hraungambravist og mosamelavist eru sömuleiðis með mjög litla útbreiðslu og verndargildi þeirra er lágt (1. tafla).

Nátthagavatn er skilgreint sem tegundaríkt kransþörungavatn sem er á lista Bernarsamningsins yfir vistgerðir sem þarfnast verndar. Hólmsá er flokkast sem á yngri berggrunni og hefur verið skilgreind sem forgangsvistgerð en við endurmat var verndargildi hennar metið sem miðlungs hátt (15) (1. tafla).



2. kort. Vistgerðir í landi Gunnarshólma og Geirlands.

1. tafla. Flatarmál (ha), hlutfall (%) og verndargildi (ef við á) vistlenda og vistgerða/annara landgerða í landi Gunnarshólma og Geirlands.

Vistlendi/Aðrar landgerðir Vistgerð/Flokkar annarra landgerða	Flatarmál (ha)	Hlutfall (%)	Verndar- gildi frummat ¹	Verndar- gildi endurmat ²	Forgangs- vistgerð ³	Bernar- samningur ⁴
L1 Melar og sandlendi	0,500	<1				
L1.2 Mosamelavist	0,493	<1	Lágt	5		
L5 Moslendi	2,400	4				
L5.3 Hraungambravist	2,351	4	Lágt	7		
L8 Votlendi	0,300	<1				
L8.9 Starungsmýravist	0,270	<1	Mjög hátt	32	x	x
L8.13 Tjarnastararflóavist	0,002	<1	Mjög hátt	29		x
L8.14 Gulstararflóavist	0,015	<1	Mjög hátt	32	x	x
L9 Graslendi	12,100	19				
L9.4 Snarrótarvist	1,825	3	Hátt	21		x
L9.5 Grasengjavist	3,139	5	Hátt	21		x
L9.6 Língresis- og vingulsvist	7,140	11	Hátt	21		x
L10 Mólendi	9,500	15				
L10.2 Flagmóavist	0,154	<1	Hátt	5		x
L10.4 Grasmóavist	2,363	4	Miðlungs	18		x
L10.8 Lyngmóavist á láglendi	6,125	10	Hátt	21		x
L10.10 Víðikjarrvist	0,851	1	Mjög hátt	25		x
L14 Aðrar landgerðir	39,700	62				
L14.1 Péttylí og annað manngert land	9,322	15		4		
L14.2 Tún og akurlendi	21,146	33		9		
L14.3 Skógrækt	2,600	4		4		
L14.4 Alaskalúpína	3,292	5		4		
L14.5 Uppgræðslur	3,364	5				
V1 Stöðuvötn						
V1.3 Tegundarík kranspörungavötn			Hátt	13		
V2 Straumvötn						x
V2.3 Ár á yngri berggrunni			Miðlungs	15	x	
Samtals	64	100				

*Nátthagavatn

**Hólmsá

¹ Frummat á verndargildi skv. Jóni Gunnari Ottósson o.fl., 2016.² Endurmat á verndargildi (gildi finnast á bilinu 3–38) skv. Olgu Kolbrúnu Vilmundardóttur o.fl., 2019.³ Forgangsvistgerð skv. endurmati á verndargildi (Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 2019).⁴ Á lista Bernarsamningsins frá 2014 yfir vistgerðir sem þarfnast verndar (Council of Europe, 2019).

Alls fundust 153 æðplöntutegundir á vettvangi, auk ættkvísla undafífla (*Hieracium*) og túnfífla (*Taraxacum*). Fyrir úttektina voru 73 æðplöntutegundir skráðar á svæðinu í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar (1. viðauki). Með nýrri skráningu eru því nú 160 tegundir, auk fyrrnefndra tveggja ættkvísla, skráðar á athugunarsvæðinu. Engar mosa- eða fléttutegundir eru skráðar innan athugunarsvæðis samkvæmt gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar.

Ein friðuð tegund, lækjabrúða (*Callitriche brutia* var. *brutia*), hefur fundist í nágrenni við athugunarsvæðið og er skráð með vaxtarstað í Náttthagavatni. Hún er með verndargildi 7 og er skráð á válista sem tegund sem vantar gögn um (DD) (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018b; Auglýsing um friðun æðplantna, mosa og fléttna nr. 1385, 2021) (2. tafla). Ekki gafst tækifæri til að leita að henni í og við Náttthagavatn eins og ráðgert var en hún fannst ekki við Hólmsá. Lækjabrúða er ekki auðgreinanleg frá vorbrúðu (*Callitriche palustris*) sem fannst í Hólmsá (7. mynd) en hún greinist frá síðarnefndu á stilkudum blómum og aldinum. Því er ekki hægt að útiloka að lækjabrúða þrífist meðfram Náttthagavatni eða Hólmsá.

Laugamaðra (*Galium uliginosum*) er sjaldgæf tegund sem fannst meðfram árbökkum Hólmsár (8. mynd). Hún er með verndargildi 6 og er með mjög gloppótta útbreiðslu á Íslandi (2. tafla).

Bakkaarfi (*Stellaria alsine*) er afar sjaldgæf tegund á Íslandi. Hann var fyrst skráður við Staðarfell á Fellsströnd árið 1840 en fannst ekki aftur fyrr en árið 2005 við Bugðu við Rauðhóla í Heiðmörk (Kristbjörn Egilsson og Guðmundur Guðjónsson, 2006). Tegundin fannst á vettvangi á tveimur stöðum við árbakka Hólmsár, sem og í lækjarfarvegi við hraunjaðar sunnan Hringvegar (9. mynd).

Töluvert af votlendis- og vatnablöntum vex meðfram Hólmsá og í nágrenni. Sem dæmi má nefna efjugras (*Limosella aquatica*), hnúðsef (*Juncus bulbosus*) og kattarjurt (*Rorippa islandica*) sem allar eru með verndargildi 4 (2. tafla). Einnig má nefna alurt (*Subularia aquatica*), þrjár skúfutegundir (*Eleocharis* spp.), síkjamara (*Myriophyllum alterniflorum*) og grasnykru (*Potamogeton gramineus*).

Á athugunarsvæðinu, sérstaklega í landi Geirlands, var töluvert af svokölluðum reskitegundum, þ.e. tegundum sem þrífast vel í röskuðu landi. Þetta eru oft slæðingar, bæði ílendir og nýlegir. Dæmi um ílenda slæðinga sem fundust eru geitakál (*Aegopodium podagraria*), fjallakornblóm (*Cyanus montanus*), freyjubrá (*Leucanthemum vulgare*), dagstjarna (*Silene dioica*) hóffífill (*Tussilago farfara*) og garðamariustakkur (*Alchemilla mollis*). Dæmi um nýlega slæðinga sem fundust eru skógarvatnsblóm (*Aquilegia vulgaris*), randagras (*Phalaris* sp.), og burstavalurt (*Symphytum asperum*).

Á svæðinu hefur verið plantað töluverðu magni af erlendum trjátegundum, aðallega norðan Suðurlandsvegar. Meðal tegunda eru stafafura (*Pinus contorta*), sitkagreni (*Picea sitchensis*) og alaskaösp (*Populus trichocarpa*).

Tvær æðplöntutegundir hafa verið skilgreindar sem ágengar tegundir á Íslandi, alaskalúpína (*Lupinus nootkatensis*) og skógarkerfill (*Anthriscus sylvestris*). Báðar tegundir vaxa á athugunarsvæðinu. Skógarkerfill vex aðallega meðfram Vesturlandsvegi en alaskalúpína er dreifðari og myndar töluverðar breiður á svæðinu (2. kort).

Engar mosa- eða fléttutegundir hafa verið skráðar í gagnagrunn Náttúrufræðistofnunar á athugunarsvæðinu.



2. tafla. Sjaldgæfar eða fremur sjaldgæfar æðplöntutegundir sem voru skráðar í vettvangsvinnu eða eru skráðar í gagnagrunn Náttúrufræðistofnunar á athugunarsvæðinu í landi Gunnarshólma og Geirlands. Tegundum er raðað eftir verndargildi og síðan í stafrófsröð samkvæmt latneskum nöfnum.

Latneskt nafn	Íslenskt nafn	Algengni	Verndargildi	Válisti*	Friðun**
<i>Callitriche brutia</i> var. <i>brutia</i>	Lækjabrúða	■□	7	DD	Friðuð
<i>Galium uliginosum</i>	Laugamaðra	■ ■ □ □	6		
<i>Juncus bulbosus</i>	Hnúðsef	■ ■ □ □	4		
<i>Limosella aquatica</i>	Efjugras	■ ■ □ □	4		
<i>Rorippa islandica</i>	Kattarjurt	■ ■ □ □	4		
<i>Stellaria alsine</i>	Bakkaarfi***				

* Skammstöfunum varðandi válista er eftirfarandi: DD: vantar gögn (Data deficient).

** Friðuð samkvæmt auglýsing um friðun æðplantna, mosa og fléttna, nr. 1385, 2021

*** Bakkaarfi hefur aðeins fundist tvisvar áður á Íslandi. Tegundin er mjög sjaldgæf en er hvorki á válista né friðuð.



7. mynd. Vorbrúða (*Callitriche palustris*) vex í Hólmsá. Ljós. Magnus Göransson, 16. júlí 2024.



8. mynd. Laugamaðra (*Galium uliginosum*) er sjaldgæf tegund sem fannst meðfram árbökkum Hólmsár. Hún er með verndargildi 6 og er með mjög gloppótta útbreiðsla á Íslandi. Ljós. Magnus Göransson, 16. júlí 2024.



9. mynd Bakkaarfi (*Stellaria alsine*) er afar sjaldgæf tegund á Íslandi og hefur áður einungis verið skráður á tveimur stöðum á landinu. Hann fannst á vettvangi á tveimur stöðum við árbakka Hólmsár sem og í lækjarfarvegi í hraunjaðri sunnan Hringvegar. Ljós. Rannveig Thoroddsen, 16. júlí 2024.

4.3 Fuglar

Samtals voru skráðar 20 fuglategundir skráðar við athuganir á framkvæmdasvæðinu sumarið 2024. Af þeim voru 17 tegundir staðfestir eða líklegir varpfuglar innan eða í grennd við svæðið. Auk þess sáust þrír hrafnar, kjói og sílamáfur á flugi í yfir svæðið.

Við vatnafuglatalningar sáust samtals átta tegundir sem allar teljast til staðfesta eða líklegra varpfugla á þessum slóðum. Þetta voru álf, grágæs, rauðhöfðaönd, urtönd, stokkönd, skúfönd og toppönd og óðinshani (3. tafla). Í ágúst sáust þrjár stokkandarkollur með unga á Hólmsá og álfapar með unga. Í maí sást varpleg álf við innfallið í Nátthagavatn að sunnanverðu og gæti hún hafa verpt þar í grenndinni. Þá sást varpleg toppandarkolla á Hólmsá.

3. tafla. Fuglategundir sem sáust við Hólmsá og Nátthagavatn í þremur vettvangsferðum sumarið 2024.

Tegund	Fjöldi alls	Kvenfuglar	Karlfuglar	Ungar
Vettvangsverð 22.5.2024				
Álf	1			
Grágæs	3			
Rauðhöfðaönd	1		1	
Urtönd	2	1	1	
Stokkönd	9	4	5	
Skúfönd	9	3	6	
Toppönd	3	1	2	
Vettvangsferð 3.6.2024				
Álf	1			
Grágæs	8			
Rauðhöfðaönd	3		3	
Urtönd	2		2	
Stokkönd	8	4	4	
Skúfönd	2	1	1	
Toppönd	8	3	5	
Óðinshani	3			
Vettvangsferð 4.8.2024				
Álf	7	1	1	5
Stokkönd	10*	3		7*
Toppönd	1	1		

Níu tegundir varpfugla voru skráðar við mófuglatalningar í júní (4. tafla). Þúfuttlingur var algengasti varpfuglinn, með 66 varpóðul. Næstalgengastur var hrossagaukur með 23 óðul en skógarpröstur fylgdi þar á eftir með 17 óðul. Af öðrum tegundum má nefna stelk, heiðlóu og spóa. Tveir lóuprælar sáust og einn jaðrakan. Svartprestir voru í trjám við Gunnarshólma og Geirland.



4. tafla. Fuglategundir sem sáust við mófuglatalningar í júní 2024.

Tegund	Fjöldi varpóðala
Heiðlóa	4
Hrossagaukur	23
Jaðrakan	1
Lóupræll	2
Skógarpröstur	17
Spói	4
Stelkur	4
Svartpröstur	2
Þúfuttittlingur	66

5 UMRÆÐUR

Framkvæmdir við uppbyggingu mannvirkja geta haft bein og óbein áhrif á náttúrufar á viðkomandi svæðum. Viðkvæmni vistgerða fyrir raski er mismunandi, se mog sá tími sem það tekur gróður að jafna sig. Íslenskur þurrlendisjarðvegur er almennt mjög rofgjarn (Ólafur Gestur Arnalds, 2023). Graslendi hefur þó almennt nokkuð gott þanþol gegn raski. Moslendi er hins vegar viðkvæmt fyrir raski. Mólendi hefur mismikið þanþol eftir vistgerðum. Grösugar mólendisvistgerðir, t.d. grasmóavist, hafa frekar gott þanþol gegn raski.

Áhrif mannvistar eru áberandi á athugunarsvæðinu og endurspeglast meðal annars í því að hlutdeild flokka annarra landgerða er rúmlega 60% af svæðinu. Plöntutegundir sem fylgja gjarnan mannum hafa áhrif á tegundasamsetningu náttúrulegra vistgerða, sem gerir það að verkum að gróðurfar svæðisins ber svip af búsetulandslagi. Hluti svæðisins er raskað land, bæði ógróið og gróið. Nýlegt rask sem var áberandi á vettvangi tengist aðallega vegaframkvæmdum við Suðurlandsveg. Á svæðinu er einnig um 20-30 ára gömul efnisgeymsla í landi Geirlands sem enn í dag er nýtt sem málargeymsla og bílastæði fyrir vinnuvélar (10. mynd). Gróið raskað land er til dæmis að finna á vegfláum og gördum í kringum efnisgeymsluna sem hafa verið græddir upp. Einnig má nefna framræst votlendi við Geirland, sem nú er að hluta kortlagt sem graslendi, en búið er að umbylta hluta þess í malarplan. Mannshöndin hefur komið við sögu í graslendinu sunnan Þjóðveggar þar sem sjást lítilega ummerki um uppgræðslu með grösom og/eða áburðardreifingu.





10. mynd. Töluvert raskað land er á athugunarsvæðinu, bæði gróði og ógróðið. Séð til suðvesturs frá Geirlandi yfir framræst land, malarplön og efnisgeymslusvæði, auk nýlegs rasks vegna framvæmda við breikkun Suðurlandsvegur. Ljós. Magnus Göransson, 16. júlí 2024.

5.1 Jarðfræði

Almennt er verndargildi jarðminja á athugunarsvæðinu frekar lágt. Yfirborð Leitarhrauns sést lítið þar sem það er hulið seti, en hraunjaðarinn við Hólmsá er undantekning og þar er verndargildið hátt. Gervigigar eru við Gunnarshólma en þeir er mjög sjaldgæfir á heimsvísu og hafa hátt verndargildi. Æskilegt er að hlífa gervigígunum eins og kostur er.

5.2 Vistgerðir og flóra

Eins og að framan greinir endurspeglast áhrif mannvistar í gróðurfari á athugunarsvæðinu og tilheyrandi rask getur dregið úr verndargildi vistgerða. Þrátt fyrir það eru nokkrar vistgerðir með hátt eða mjög hátt verndargildi á svæðinu. Helst ber að nefna vel grónar og gróskumiklar vistgerðir þar sem jarðvegur inniheldur miðlungs til mikið kolefni, svo sem graslendisvistgerðir sunnan Þjóðvegur og í framræstu landi við Geirland, sem og grasengjavist, votlendisbletti og víðikjarrvist meðfram Hólmsá sem hluti af bakkagróðri (11. mynd). Bakkagróður nýtur verndar 62. gr. náttúruverndarlaga (Lög um náttúruvernd nr. 60, 2013). Engir votlendisflákar uppfylla skilyrði 61. gr. náttúruverndarlaga um sérstaka vernd samfellds votlendis stærra en 2 ha. Verndargildi lyngmóavistar á láglendi og grasmóavistar er einnig hátt en gróðurþekja og gróska þeirra var mismikil eftir flákum. Á sumum stöðum var gróðurinn gisin og lágvaxinn en annar staðar fundust gróskumeiri og tegundaríkari lyng- og grasmóablettir, sem auka tegundafjölbreytni á svæðinu. Einnig ber að hafa í huga að verndargildi ferskvatnsvistgerða er miðlungs til hátt auk þess sem önnur verndarsjónarmið gilda um þær.



11. mynd. Bakkagróður við Hólmsá. Í forgrunni vex lágvaxinn gulvíðir innan um grös og mýrastör, en hávaxin gulstör myndar gróskulegan votlendisblett við bakkann. Alaskalúpína sækir á og er sumstaðar farin að taka yfir náttúrulegan bakkagróður sem fellur undir náttúruverndarlög. Ljós. Rannveig Thoroddsen, 16. júlí 2024.

Engar æðplöntutegundir á válista eða friðaðar fundust á vettvangi eða hafa áður verið skráðar innan sjálfs athugunarsvæðisins. Hins vegar er lækjarbrúða, sem er friðuð og á válista, skráð í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar með vaxtarstað í Nátthagavatni (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2018b; Auglýsing um friðun æðplantna, mosa og fléttna, nr. 1385, 2021). Þó að hún hafi ekki fundist í vettvangsrannsókninni er ekki hægt að útiloka að tegundin þrífist við strandlengju Nátthagavatns eða Hólmsá.

Nokkrar tegundir sem hafa fremur takmarkaða útbreiðslu á landsvísu fundust á vettvangi, flestar vaxa í deig- og votlendi líkt og er víða við bakka Hólmsár, svo sem laugamaðra, efjugras, kattarjurt og hnúðsef, sem er vatnaplanta. Einnig fundust nokkrar aðrar vatnaplöntur á vettvangi en almennt hafa vatnaplöntur fremur takmarkaða útbreiðslu þar sem þær eru bundnar við mjög sérhæfð búsvæði.

Vert er að minnast á bakkaarfa sem fannst á þremur stöðum á svæðinu. Óvíst er hvort hann sé innlend tegund eða hafi borist til landsins á seinni tímum (Wasowicz o.fl., 2013). Hann er mjög sjaldgæfur á Íslandi og hefur einungis fundist á tveimur stöðum á landinu. Þar sem uppruni hans er óljós er mælt með að beita varúðarreglunni ef hætta er á röskun vaxtarstaðar hans (Aagot V. Óskarsdóttir, 2011).

Á athugunarsvæðinu var töluvert um slæðinga og reskitegundir. Meðfram þjóðveginum fundust tvær tegundir, alaskalúpína og skógarkerfill, sem skilgreindar eru sem framandi ágengar tegundir í íslenskri náttúru (Wasowicz o.fl., 2013). Skógarkerfill er nokkuð staðbundinn meðfram veginum en alaskalúpína myndar breiður, sérstaklega norðan vegarins, auk þess sem hún vex við bakka Hólmsár, einkum neðan við Miðhól þar sem hún myndar allstóran og samfelldan fláka. Út frá misgömlum loftmyndum

(Loftmyndir ehf. 2025) má sjá að alaskalúpa hefur smátt og smátt náð meiri útbreiðslu á svæðinu líkt og víðar á þessum slóðum.

Auk alaskalúpínu og skógarkerfils fundust sex aðrar æðplöntutegundir sem hafa verið skráðar á lista yfir framandi, mögulega ágengar tegundir (Menja von Schmalensee, 2010). Af þeim voru tvær innan athugunarsvæðisins, þ.e. stafafura og viðja. Dreifigeta stafafuru hefur verið rannsökuð hérlandis og sýnt hefur verið fram á að hún getur dreift sér langar leiðir með fræjum (Ólafur Eggertsson o.fl. 2022; Wasowicz o.fl., 2025). Hún virðist samkeppnishæf, jafnvel við náttúrulegan birkiskóg (Wasowicz o.fl., 2025). Önnur tegund, garðamaríustakkur, virðist vera að sækja í sig veðrið víða á landinu nálægt byggð. Hún hefur dreift sér á árbakka Hólmsár og í kringum Nátthagavatn (12. mynd). Garðamaríustakkur er fremur stórvaxin tegund með breið blöð (13. mynd), sem getur haft neikvæð áhrif á flóruna, ekki síst á lágvaxnar tegundir tegundir sem þarna vaxa sem sumar hverjar er fremur sjaldgæfar.

Norðan þjóðvegur, sérstaklega í landi Geirlands, er mikið af reskitemundum sem sennilega hafa borist með garðaúrgangi. Sem dæmi má nefna fjallakornblóm, hóffífil, dagstjörnu, engjamunablóm, freyjubrá, geitakál, hlíðableikju, skógarvatnsbera, randagras, og rauðsmára. Þetta svæði er nú þegar töluvert raskað, en engu að síður er óæskilegt að framandi tegundir dreifist þaðan. Æskilegt væri að grípa til aðgerða til að hefta útbreiðslu þeirra, sem og annarra framandi, ágengra eða mögulega ágengra tegunda.



12. mynd. Yfirlitsmynd yfir Hólmsá, Miðmundahól og Nátthagavatn. Útbreiðsla garðslæðingsins garðamaríustakks (*Alchemilla mollis*) sést sem gulgrænir blettir meðfram ánni og vatninu. Upp af árbakkanum eru breiður af alaskalúpínu (*Lupinus nootkatensis*) sem er framandi ágeng tegund. Ljós. Robert A. Askew, 22. ágúst 2024.



13. mynd. Garðamaríustakkur (*Alchemilla mollis*) er tegund sem sækir á víða á landinu nálægt byggð og hefur eiginleika sambærilega við ágengar tegundir. Alaskalúpína (*Lupinus nootkatensis*) er skráð sem framandi ágeng tegund og viðja (*Salix borealis*) sem mögulega ágeng tegund (Menja von Schmalensee, 2010). Ljós. Rannveig Thoroddsen, 16. júlí 2024.

5.3 Fuglar

Framkvæmdasvæðið ber umtalsverð merki mannvistar. Innan þess er að finna gamalt tún, trjárækt, vegi og byggingar og þá er lúpína víða að dreifa úr sér. Mikill umferðarpungi er á Suðurlandsvegi og sunnan hans liggur rafmagnslína. Þekkt er að ýmis mannvirki, sem og hár gróður, geta haft neikvæð jaðaráhrif á mófugla sem lýsa sér þannig að þéttleiki sumra tegunda er lægri nær en fjær þeim (Böðvar Þórisson o.fl., 2019; Tómas Grétar Gunnarsson, 2020; Pálsdóttir o.fl., 2022; Pálsdóttir o.fl., 2024). Við athuganir sumarið 2024 voru átta tegundir mófugla skráðar á svæðinu. Fyrir utan þúfutittling var þéttleiki þeirra þó ekki ýkja mikill. Þá sást nokkur fjöldi andfugla á svæðinu og allar tegundirnar teljast varpfuglar innan eða í nágrenni framkvæmdasvæðisins.

Meðal annarra varpfugla sem hafa verið skráðir á framkvæmdasvæðinu eru duggönd, rjúpa, tjaldur, sandlóa, steindpill og maríuerla. Straumönd sést reglulega við útfall árinna úr Náttthagavatni og hún hefur verpt við Ármótakvísl, milli Suðurár og Hólmsár (Jóhann Óli Hilmarsson, 2008). Í 2. viðauka er að finna yfirlit yfir þá varpfugla sem skráðir hafa verið innan svæðisins.

Allar tegundir varpfugla sem sáust við athuganir 2024 teljast algengar á landsvísu. Álf, heiðlóa, lóupræll og óðinshani eru forgangstegundir á lista Bernarsamningsins. Fimm tegundir teljast til ábyrgðartegunda Íslands sökum þess hve stór hluti Evrópustofna viðkomandi tegunda reiðir sig á Ísland til varps. Þetta eru heiðlóa, lóupræll, jaðrakan, spói og stelkur. Þá telst stelkur vera í yfirvofandi hættu vegna fækkunar á vetrarstöðvum. Óðinshani er á válista en gögn skortir til að meta stöðu hans með fullnægjandi hætti (Náttúrufræðistofnun, 2018c) (2. viðauki).

Tekið skal fram að fækkun virðist vera að eiga sér stað meðal fleiri tegunda vaðfugla sem munu lenda á válista við næstu uppfærslu hans (Náttúrufræðistofnun Íslands, í vinnslu). Því er afar mikilvægt við

skipulag að forðast að raska svæðum sem eru mikilvæg fyrir vaðfugla. Fyrirhugað framkvæmdasvæði fellur þó ekki undir slíkt.

Helsta gildi svæðisins fyrir fuglalíf felst í búsvæðum vatnafugla við Hólmsá og Náttthagavatn. Við skipulag er mikilvægt að taka tillit til þess og forðast rask við ár- og vatnsbakka. Í því sambandi skal bent á að 50 m fjarlægð milli vatns og mannvirkja í skipulagsreglugerð er of knappt til að tryggja viðunandi fuglavernd og ætti að leitast við að hafa fjarlægðina meiri sé þess kostur. Þetta á einkum við svæðið sunnan brúar yfir Hólmsá en þar í næsta nágrenni er þekktur varpstaður straumandar. Einu varpstöðvar tegundarinnar í Evrópu eru hérlandis og er hún ábyrgðartegund auk þess að vera á lista Bernarsamningsins.

5.4 Samantekt

Verndargildi jarðminja á athuganasvæðinu er almennt lágt, Leitahraun er mikið til þakið seti og lítið sést í forgerðir hraunsins. Undantekningar eru jaðar Leitahrauns meðfram Hólmsá og gervigígar við Gunnarshólma sem hafa hátt verndargildi. Allnokkrar vistgerðir á athugunarsvæðinu hafa hátt eða mjög hátt verndargildi. Nokkrar tegundir æðplantna fundust sem teljast fremur sjaldgæfar eða hafa takmarkaða útbreiðslu á landsvísu. Verndargildi gróðurs felst þó fyrst og fremst í bakkagróðri meðfram Hólmsá og við Náttthagavatn (11. mynd). Áhersla er lögð á að leitast verði við að viðhalda náttúrulegum bakkagróðri sem nýtur verndar samkvæmt 62. gr. náttúruverndarlaga (Lög um náttúruvernd nr. 60, 2013) þar sem vistgerðir með hátt verndargildi og sjaldgæfar tegundir var helst að finna við árbakkann eða jafnvel í ánni. Nokkurt fuglalíf er innan framkvæmdasvæðisins en helsta gildi þess fyrir fugla er fólgið í búsvæðum vatnafugla við Hólmsá og Náttthagavatn.

Að teknu tilliti til náttúruminja er því mikilvægt að viðhalda ríflegum verndarjaðri við ár- og vatnsbakka.

6 HEIMILDIR

Aagot V Óskarsdóttir (ritstj.) (2011). *Náttúruvernd Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands*.

Umhverfisráðuneytið. https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Hvitbok_natturuvernd_001-478.pdf

Auglýsing um friðun æðplantna, mosa og fléttu nr. 1385. (2021). <https://www.stjornartidindi.is/PdfVersions.aspx?recordId=9ee5ca6c-c4f5-4263-a9b8-e34dc6fdd984>

Brynja Davíðsdóttir. (2010). *Þróun aðferða við vöktun algengra mófugla*. BS-ritgerð við Landbúnaðarháskóla Íslands. <http://hdl.handle.net/1946/7091>

Böðvar Þórisson, Aldís E. Pálsdóttir og Tómas G. Gunnarsson. (2019). *Áhrif umferðar á fuglalíf*. Styrkt af rannsóknasjóði Vegagerðarinnar. Háskóli Íslands. [https://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/ahrif_umferdar_fuglalif/\\$file/Áhrif%20umferðar%20á%20fuglalif.pdf](https://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/ahrif_umferdar_fuglalif/$file/Áhrif%20umferðar%20á%20fuglalif.pdf)

Council of Europe. (2019). *Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats: Resolution No. 4 (1996) listing endangered natural habitats requiring specific conservation measures*. <https://rm.coe.int/16807469e7>

Eggertsson, Ó, Castiglia, D. E. og Carrer, M. (2022). Natural Regeneration of Lodgepole pine (*Pinus contorta*) in Steinadalur, SE-Iceland. *Icelandic Agricultural Sciences* 35, 27–32. <https://doi.org/10.16886/IAS.2022.03>



Helgi Torfason, Árni Hjartarson, Haukur Jóhannesson, Jón Jónsson og Kristján Sæmundsson. (1999). *Berggrunnskort, Vífilfell 1613 III SA-B, 1:25.000*. Landmælingar Íslands, Orkustofnun, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær og Reykjavíkurborg.

Hörður Kristinsson, Eva G. Þorvaldsdóttir og Björgvin Steindórsson. (2007). Vöktun válistaplantna 2002–2006. *Fjölrit Náttúrufræðistofnunar* nr. 50. Náttúrufræðistofnun Íslands.
https://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_50.pdf

Ingibjörg Kaldal, Skúli Víkingsson, Haukur Jóhannesson, Kristján Sæmundsson og Helgi Torfason. (1996). *Jarðgrunnskort, Vífilfell 1613 III SA-J, 1:25.000*. Landmælingar Íslands, Orkustofnun, Garðabær, Hafnarfjarðarbær, Kópavogsbær, Seltjarnarnesbær og Reykjavíkurborg.

ÍSOR. (2025). <https://arcgisserver.isor.is/> [skoðað 26.02.2025]

Jóhann Óli Hilmarsson. (2008). *Fuglar við Suðurlandsveg*. Unnið fyrir Vegagerðina vegna breikkunar frá Hólmsá að Hveragerði.
[https://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/e02ba2887015e3fd0025771b005580a4/349a8e285e70c2fa0025756d0048f85f/\\$FILE/HomsaHveragerdi02%20Fuglaskýrsla.pdf](https://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/e02ba2887015e3fd0025771b005580a4/349a8e285e70c2fa0025756d0048f85f/$FILE/HomsaHveragerdi02%20Fuglaskýrsla.pdf)

Jón Jónsson. (1978). *Jarðfræðikort af Reykjanesskaga*. OS JHD 7831. Orkustofnun, jarðhitadeild.

Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir (ritstj.). (2016). Vistgerðir á Íslandi. *Fjölrit Náttúrufræðistofnunar* nr. 54. Náttúrufræðistofnun Íslands.
http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_54.pdf

Jón Gunnar Ottósson og Sigurður H. Magnússon. (2016). Inngangur. Í Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir (ritstj.). Vistgerðir á Íslandi, bls. 8–16. *Fjölrit Náttúrufræðistofnunar* nr. 54. Náttúrufræðistofnun Íslands.
http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_54.pdf

Kristbjörn Egilsson og Guðmundur Guðjónsson. (2006). *Gróður í Heiðmörk* (NÍ-06001). Náttúrufræðistofnun Íslands. <https://utgafa.ni.is/skyrslur/2006/NI-06001.pdf>

Loftmyndir ehf. (2025). Aðgengilegt á www.map.is. [skoðað 26.02.2025]

Lög um náttúruvernd nr. 60. (2013). <https://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html>

Lög um skóga og skógrækt nr. 33. (2019). <https://www.althingi.is/lagas/nuna/2019033.html>

Marianne Jensdóttir Fjeld, Þóra K. Hrafnisdóttir og Haraldur Rafn Ingvason. (2016). Vistgerðir í ferskvatni. Í Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir (ritstj.). Vistgerðir á Íslandi, bls. 170–213. *Fjölrit Náttúrufræðistofnunar* nr. 54. Náttúrufræðistofnun Íslands.
http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_54.pdf

Menja von Schmalensee. (2010). Vágastir í vistkerfum – seinni hluti. *Náttúrufræðingurinn* 80(3–4), 84–102.

Menningarsjóður. (1968). *Gróðurkort af Íslandi (Hálendiskort) 114 Reykjavík*.
<https://ralagrodurkort.ni.is>

Náttúrufræðistofnun Íslands. (2018a). *Vistgerðir og mikilvæg fuglasvæði á Íslandi*. 3. útgáfa. Mælikvarði 1:25.000. Náttúrufræðistofnun Íslands. <https://vistgerdakort.ni.is/>

Náttúrufræðistofnun Íslands. (2018b). *Válisti æðplantna*.
<https://www.ni.is/midlun/utgafa/valistar/plontur/valisti-aedplantna>

Náttúrufræðistofnun Íslands. (2018c). *Válisti fugla*.
<https://www.ni.is/midlun/utgafa/valistar/fuglar/valisti-fugla>



- Náttúruverndarráð. (1996). *Náttúruminjaskrá: friðlýst svæði og aðrar skráðar náttúruminjar*. 7. útgáfa. Náttúruverndarráð.
- Ólafur Gestur Arnalds. (2023). *Mold ert þú – jarðvegur og íslensk náttúra*. Iðnú.
- Olga Kolbrún Vilmundardóttir, Ásrún Elmarsdóttir, Borgþór Magnússon, Guðmundur Guðmundsson, Ingvar Atli Sigurðsson, Kristinn Haukur Skarphéðinsson, Kristján Jónasson, Lovísa Ásbjörnsdóttir, Marianne Jensdóttir Fjeld, Sigmar Metúsalemsson, Starri Heiðmarsson, Sunna Björk Ragnarsdóttir, Þóra Hrafnisdóttir og Trausti Baldursson. (2019). *Framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár 2018: svæðaval og ávinningur verndar* (NÍ-19008). Náttúrufræðistofnun Íslands. <https://utgafa.ni.is/skyrslur/2019/NI-19008.pdf>
- Pálsdóttir, A. E., Gill, J. A., Alves, J. A., Pálsson, S., Méndez, V., Ewing, H. og Gunnarsson, T. G. (2022). Subarctic afforestation: Effects of forest plantations on ground-nesting birds in lowland Iceland. *Journal of Applied Ecology* 59(10), 2456–2467. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14238>
- Pálsdóttir, A. E., Alves, J. A., Gill, J. A., Pálsson, S., Méndez, V. og Gunnarsson, T. G. (2024). Introduction of summer houses into semi-natural habitats: impacts on ground-nesting birds. *Animal Conservation* 27, 648–658. <https://doi.org/10.1111/acv.12938>
- QGIS Development Team. (2025). *QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project*. <http://qgis.osgeo.org> [skoðað 26.02.2025]
- Sigurður H. Magnússon, Borgþór Magnússon, Ásrún Elmarsdóttir, Sigmar Metúsalemsson og Hans H. Hansen. (2016). Vistgerðir á landi. Í: Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir (ritstj.) *Vistgerðir á Íslandi*, bls. 17–169. *Fjölrit Náttúrufræðistofnunar* nr. 54. Náttúrufræðistofnun Íslands. http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_54.pdf
- Tómas Grétar Gunnarsson. (2020). Búsvæði og vernd íslenskra vaðfugla. *Náttúrufræðingurinn* 90(2–3), 145–162.
- Umhverfissvið Kópavogsbæjar. (2022). *Aðalskipulag Kópavogs 2019 – 2040*. Unnið af Umhverfissviði Kópavogsbæjar. <https://www.kopavogur.is/is/umhverfismal/skipulagsmal/adalskipulag>
- Wasowicz, P., Przedpelska-Wasowicz, E. M. og Kristinsson, H. (2013). Alien vascular plants in Iceland: Diversity, spatial patterns, temporal trends, and the impact of climate change. *Flora Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants* 208(10–12), 648–673. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2013.09.009>
- Wasowicz, P. (2020). Annotated checklist of vascular plants of Iceland. *Fjölrit Náttúrufræðistofnunar* nr. 57. Náttúrufræðistofnun Íslands. <https://doi.org/10.33112/1027-832X.57>
- Wasowicz, P., Óskarsdóttir, G. og Þórhallsdóttir, Þ. E. (2025). Lodgepole pine (*Pinus contorta* Douglas ex Loudon) invasion in subarctic Iceland: evidence from a long-term study. *NeoBiota* 97, 47–66. <https://doi.org/10.3897/neobiota.97.134047>

7 VIÐAUKAR

1. viðauki. Tegundir sem skráðar voru á vettvangi og í gagnagrunni Náttúrufræðistofnunar, ásamt upplýsingum um algengi, verndargildi, válista og friðun. Einnig er tilgreint hvort tegundin er innlend eða aðflutt (Wasowicz, 2020) eða telst framandi ágeng tegund (Wasowicz o.fl., 2013).

Latneskt nafn	Íslenskt nafn	Algengi*	Verndargildi	Válisti**	Friðun	Vettvangsvinna 2024	Gagnagrunnur Nátt	Innlend	Óvísst innlend	Fornaðflutt	Aðflutt	Ágeng framandi tegund	Ræktað tegund
<i>Achillea millefolium</i>	Vallhumall	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geitakál	ÍLSL				1					1		
<i>Agrostis capillaris</i>	Hálíngresi	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Agrostis stolonifera</i>	Skriðlíngresi	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Agrostis vinealis</i>	Týtulíngresi	■■■□□□	1			1		1					
<i>Alchemilla alpina</i>	Ljónslappi	■■■□□□	1			1		1					
<i>Alchemilla filicaulis</i>	Hlíðamariústakkur	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Alchemilla mollis</i>	Garðamariústakkur	ÍLSL				1					1		
<i>Alchemilla wichurae</i>	Silfuramariústakkur	■■■□□□	2			1		1					
<i>Alopecurus aequalis</i>	Vatnsliðagras	■■■□□□	2			1		1					
<i>Alopecurus pratensis</i>	Háliðagras	ÍLSL				1					1		
<i>Angelica archangelica</i>	Ætíhvönn	■■■□□□	1			1		1					
<i>Anthoxanthum nipponicum</i>	Ilmreyr	■■■□□□	1			1		1					
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Skógarkerfill	ÍLSL				1	1				1	1	
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Skógarvatnsberi					1							1
<i>Arabidopsis petraea</i>	Melablóm	■■■□□□	1			1		1					
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Sortulyng	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Arenaria norvegica</i>	Skeggsandi	■■■□□□	1				1	1					
<i>Armeria maritima</i>	Geldingahnappur	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Avenella flexuosa</i>	Bugðupuntur	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Barbarea stricta</i>	Hlíðableikja	ÍLSL				1					1		
<i>Bartsia alpina</i>	Smjörgras	■■■□□□	1			1		1					
<i>Betula pubescens</i>	Birki	■■■□□□	1			1		1					
<i>Bistorta vivipara</i>	Kornsúra	■■■□□□	1			1		1					
<i>Botrychium lunaria</i>	Tungljurt	■■■□□□	1			1		1					
<i>Calamagrostis neglecta</i>	Hálmgresi	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Callitriche brutia</i> var. <i>brutia</i>	Lækjabrúða	■□	7	DD	F		1	1					
<i>Callitriche brutia</i> var. <i>hamulata</i>	Síkjabruða	■■■□□□	1				1	1					
<i>Callitriche palustris</i>	Vorbrúða	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Calluna vulgaris</i>	Beitilyng	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Cardamine polemonioides</i>	Hrafnaklukka	■■■□□□	1			1		1					
<i>Carex bigelowii</i>	Stinnastör	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Carex canescens</i>	Blátoppastör	■■■□□□	1			1		1					



Latneskt nafn	Íslenskt nafn	Algengni*	Verndargildi	Válisti**	Fríðun	Vettvangsvinna 2024	Gagnagrunnur Nátt	Innlend	Óvísst innlend	Fornaðflutt	Aðflutt	Ágeng framanandi tegund	Ræktað tegund
<i>Carex capillaris</i>	Hárleggjastör	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Carex lyngbyei</i>	Gulstör	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Carex nigra</i>	Mýrastör	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Carex panicea</i>	Belgjastör	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Carex rostrata</i>	Tjarnastör	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Cerastium alpinum</i>	Músareyra	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Cerastium fontanum</i>	Vegarfi	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Coeloglossum viride</i>	Barnarót	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Comarum palustre</i>	Engjarós	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Corallorhiza trifida</i>	Kræklurót	■■■■□	2			1		1					
<i>Cyanus montanus</i>	Fjallakornblóm	ÍLSL				1						1	
<i>Cystopteris fragilis</i>	Tófugras	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Brönugrös	■■□□□	3			1		1					
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Snarrótarpuntur	■■■■□□□	1			1	1		1				
<i>Dryas octopetala</i>	Holtasóley	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Eleocharis palustris</i>	Vatnsnál	■■■■□□□	2			1		1					
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	Fitjaskúfur	■■■■□□	2			1		1					
<i>Eleocharis uniglumis</i>	Vætuskúfur	■■□□□	2			1		1					
<i>Elytrigia repens</i>	Húsapuntur	■■■■□□□	1			1				1			
<i>Empetrum nigrum</i>	Krækilyng	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Epilobium ciliatum</i>	Vætudúnurt	ÍLSL				1						1	
<i>Epilobium palustre</i>	Mýradúnurt	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Equisetum arvense</i>	Klóelfting	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Equisetum fluviatile</i>	Fergin	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Equisetum palustre</i>	Mýrelfting	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Equisetum pratense</i>	Vallelfting	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Equisetum variegatum</i>	Beitieski	■■■■□□□	1				1	1					
<i>Erigeron borealis</i>	Jakobsfífill	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Klófíffa	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	Hrafnaífíffa	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Euphrasia wettsteinii</i>	Augnfró	■■■■□□□	1				1	1					
<i>Festuca richardsonii</i>	Túnvingull	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Festuca vivipara</i>	Blávingull	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Filipendula ulmaria</i>	Mjaðjurt	■■□□□	3			1		1					
<i>Galium boreale</i>	Krossmaðra	■■□□□	2			1	1	1					
<i>Galium normanii</i>	Hvítmaðra	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Galium uliginosum</i>	Laugamaðra	■■□□	6			1		1					
<i>Galium verum</i>	Gulmaðra	■■■■□□□	1			1	1	1					



Latneskt nafn	Íslenskt nafn	Algengni*	Verndargildi	Válisti**	Fríðun	Vettvangsvinna 2024	Gagnagrunnur Nátt	Innlend	Óvísst innlend	Fornaðflutt	Aðflutt	Ágeng framtíð tegund	Ræktað tegund
<i>Geranium sylvaticum</i>	Blágresi	■■■□□□	1			1		1					
<i>Geum rivale</i>	Fjalldalafífill	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Þrílaufungur	■■□□□	2			1		1					
<i>Hieracium spp.</i>	Undafíflar					1		1					
<i>Huperzia sp.</i>	Skollafingur	■■■□□□	2			1		1					
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	Mýrasef	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Juncus arcticus</i>	Hrossanál	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Juncus articulatus</i>	Laugasef	■■■□□	2			1	1	1					
<i>Juncus biglumis</i>	Flagasef	■■■□□□	1			1		1					
<i>Juncus bulbosus</i>	Hnúðsef	■■□□	4			1		1					
<i>Juncus filiformis</i>	Þráðsef	■■□□□	2			1		1					
<i>Juncus ranarius</i>	Lindasef	■■■□□	1			1	1	1					
<i>Juncus trifidus</i>	Móasef	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Juncus triglumis</i>	Blómsef	■■■□□□	1			1		1					
<i>Kalmia procumbens</i>	Sauðamergur	■■■□□□	2			1		1					
<i>Koenigia islandica</i>	Naflagras	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Larix sibirica</i>	Síberíulerki					1							1
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Freyjubrá	ÍLSL				1					1		
<i>Leymus arenarius</i>	Melgresi	■■□□□	1			1	1	1					
<i>Limosella aquatica</i>	Efjugras	■■□□	4			1		1					
<i>Lupinus nootkatensis</i>	Alaskalúpína	ÍLSL	0			1	1				1	1	
<i>Luzula multiflora</i>	Vallhæra	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Luzula spicata</i>	Axhæra	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Montia fontana</i>	Lækjagrýta	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Myosotis arvensis</i>	Gleym-mér-ei	■■□□□	1			1				1			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Engjamunablóm	ÍLSL				1					1		
<i>Myriophyllum alterniflorum</i>	Síkjamarí	■■■□□□	2			1	1	1					
<i>Papaver croceum</i>	Garðasól	ÍLSL				1					1		
<i>Parnassia palustris</i>	Mýrasóley	■■■□□□	1				1	1					
<i>Phalaris sp.</i>	Randagras					1							1
<i>Phegopteris connectilis</i>	Þríhyrnuburkni	■■□□	3			1		1					
<i>Phleum pratense</i>	Vallarfoxgras	ÍLSL				1					1		
<i>Picea sitchensis</i>	Sitkagreni	ÍLSL				1					1		
<i>Pilosella islandica</i>	Íslandsfífill	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Lyfjagras	■■■□□□	1			1		1					
<i>Pinus contorta</i>	Stafafura	ÍLSL				1					1		
<i>Plantago maritima</i>	Kattartunga	■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Platanthera hyperborea</i>	Friggjargras	■■■□□□	1			1	1	1					



Latneskt nafn	Íslenskt nafn	Algengni*	Verndargildi	Válisti**	Fríðun	Vettvangsvinna 2024	Gagnagrunnur Nátt	Innlend	Óvísst innlend	Fornaðflutt	Aðflutt	Ágeng frامandi tegund	Ræktað tegund
<i>Poa glauca</i>	Blásveifgras	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Poa nemoralis</i>	Kjarrsveifgras	■■■■□□	1			1		1					
<i>Poa pratensis</i>	Vallarsveifgras	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Poa trivialis</i>	Hásveifgras	■■■■□□	3			1		1					
<i>Populus trichocarpa</i>	Balsamösp/Alaskaösp	ÍLSL				1					1		
<i>Potamogeton gramineus</i>	Grasnykra	■■■■□□□	2			1	1	1					
<i>Potentilla anserina</i>	Tágamura	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Potentilla crantzii</i>	Gullmura	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Ranunculus confervoides</i>	Lónasóley	■■■■□□□	2			1	1	1					
<i>Ranunculus repens</i>	Skriðsóley	■■□□□	1			1				1			
<i>Ranunculus reptans</i>	Flagasóley	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Ranunculus subborealis</i>	Brennisóley	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Rheum rhubarbarum</i>	Rabbabari					1							1
<i>Rhinanthus minor</i>	Lokasjóður	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Rhodiola rosea</i>	Burnirót	■■■■□□	2			1		1					
<i>Ribes nigrum</i>	Sólberjarífs					1							1
<i>Rorippa islandica</i>	Kattarjurt	■■□□	4			1		1					
<i>Rubus saxatilis</i>	Hrútaber	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Rumex acetosa</i>	Túnsúra	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Rumex acetosella</i>	Hundasúra	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Rumex longifolius</i>	Njóli	■■■■□□□	1			1			1				
<i>Sagina nodosa</i>	Hnúskakrækill	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Sagina procumbens</i>	Skammkrækill	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Salix arctica</i>	Fjallavíðir	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Salix borealis</i>	Viðja	ÍLSL				1					1		
<i>Salix herbacea</i>	Grasvíðir	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Salix lanata</i>	Loðvíðir	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Salix phylicifolia</i>	Gulvíðir	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Scorzoneroideis autumnalis</i>	Skarífífill	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Sedum villosum</i>	Flagahnoðri	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Selaginella selaginoides</i>	Mosajafni	■■■■□□□	1				1	1					
<i>Silene acaulis</i>	Lambgras	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Silene dioica</i>	Dagstjarna	ÍLSL				1					1		
<i>Silene uniflora</i>	Holurt	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Sorbus aucuparia</i>	Reynir	■■■■□□	3			1		1					
<i>Spergula arvensis</i>	Skurfa	■■□□□	2			1	1			1			
<i>Stellaria alsine</i>	Bakkaarfi					1					1		
<i>Stuckenia filiformis</i>	Þráðnykra	■■■■□□□	1			1	1	1					



Latneskt nafn	Íslenskt nafn	Algengni*	Verndargildi	Válisti**	Fríðun	Vettvangsvinna 2024	Gagnagrunnur Nátt	Innlend	Óvísst innlend	Fornaðflutt	Aðflutt	Ágeng framtíð tegund	Ræktað tegund
<i>Subularia aquatica</i>	Alurt	■■■■□□	3			1	1						
<i>Symphytum asperum</i>	Burstavalurt					1						1	
<i>Taraxacum spp.</i>	Túnfíflar	■■■■□□□				1	1						
<i>Thalictrum alpinum</i>	Brjóstagras	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Thymus praecox</i>	Blóðberg	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Trifolium pratense</i>	Rauðsmári	ÍLSL				1					1		
<i>Trifolium repens</i>	Hvítsmári	■■■■□□□	1			1	1		1				
<i>Triglochin palustris</i>	Mýrasauðlaukur	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Tussilago farfara</i>	Hóffífill	ÍLSL				1					1		
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Bláberjalyng	■■■■□□□	1			1	1	1					
<i>Veronica officinalis</i>	Hárdepla	■■■■□□□	2			1		1					
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Lækjadepla	■■■■□□□	1			1	1			1			
<i>Vicia cracca</i>	Umfeðmingur	■■■■□□□	2			1				1			
<i>Viola canina</i>	Týsfjóla	■■■■□□□	1			1		1					
<i>Viola palustris</i>	Mýrfjóla	■■■■□□□	1			1	1	1					

*Mat á algengni:

- Algeng hringinn í kringum landið í miklu magni
- Finnst hringinn í kringum landið, en ekki mikið af henni
- Finnst víða um landið, en afar strjál, eða mjög lítið í stað
- Finnst í sumum landshlutum, algeng á því svæði
- Finnst dreifð á hluta landsins, en afar strjál eða sjaldgæf, vantar í suma landshluta
- Aðeins á einu eða fáum svæðum, en algeng þar sem hún er
- Aðeins á einu eða fáum svæðum, fremur lítið af henni þar sem hún finnst
- Aðeins á einum eða fáum stöðum, mjög sjaldgæf eða lítið af henni
- ÍLSL Ílendir slæðingur

**Mat á válista: Gögn vantar [Data deficient](DD)



2. viðauki. Staðfestir eða líklegir varpfuglar innan og í grennd framkvæmdasvæðis. Fuglategundir sem sáust við athuganir 2024 eru grænritaðar. Upplýsingar um aðrar tegundir eru fengnar úr skýrslu Jóhanns Óla Hilmarssonar (2008).

Tegund	Bernarsamningur ¹	Ábyrgðartegund ²	Staða á valista ³
Álft	x		
Grágæs			
Rauðhöfðaönd			
Urtönd			
Stökkönd			
Skúfönd			
Duggönd			Í hættu
Straumönd	x	x	
Toppönd			
Rjúpa			Í yfirvofandi hættu
Tjaldur			Í nokkurri hættu
Sandlóa		x	
Heiðlóa	x	x	
Lóupræll	x	x	
Hrossagaukur			
Jaðrakan		x	
Spói		x	
Stelkur		x	Í yfirvofandi hættu
Óðinshani	x		Gögn vantar
Þúfuttittlingur			
Maríuerla			
Steindepill			
Svartþröstur			
Skógarþröstur			

¹Forgangstegundir skv. ályktun nr. 6 frá 1998, ásamt síðari breytingum.

²Miðað er við að um 20% af Evrópustofni viðkomandi tegundar nýti Ísland til varps eða komi hér við á ferðum sínum.

³Náttúrufræðistofnun Íslands 2018c. Valisti fuga, <https://www.ni.is/midlun/utgafa/valistar/fuglar/valisti-fugla>.

